


Acramite® 480 SC

Insetticida

Acaricida per la lotta contro gli acari nella coltura delle fragole e nell'orticoltura.

Prodotto	Acramite 480 SC è una sospensione concentrata (SC) e contiene 43.4 % 480 g/l bifenazato. (W-6957)
Colture	Coltivazione di bacche e Orticoltura.
Spettro di efficacia	Ragnetti
Applicazione Coltivazione di bacche	Fragola: 0.025% (0.25 lt/ha), contro <i>Ragnetti</i> . Termine d'attesa: 3 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo un trattamento per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m ² , trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Applicabile fino 11.07.2025
Orticoltura	Cucurbitacee, Melanzana, Peperone, Pomodori: 0.025% (0.25 lt/ha), contro <i>Ragnetti</i> . Termine d'attesa: 3 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo un trattamento per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Applicabile fino 11.07.2025
Coltivazione piante ornam.	Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi (Serra): 0.025% (0.25 lt/ha), contro <i>Ragnetti</i> . Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
Modalità di azione	Acramite è un acaricida selettivo. Acramite agisce per contatto e mostra dopo 4 giorni una azione « knockdown », la quale è seguita da una azione di lunga rimanenza. Il prodotto, non mostra che poco effetto contro i predatori naturali ed è predisposto, per

	una lotta nel sistema di produzione combinato con la lotta integrata.
Preparazione della poltiglia	<p>Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.</p> <p>Miscibilità: Acramite® 480SC è mescolabile con i nostri fungicidi. Fare attenzione nelle serre quando il prodotto viene mescolato con altri prodotti liquidi.</p> <p>Protezione dell'utente: Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.</p> <p>Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.</p>
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	<p>Attenzione</p>  <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	250 ml
®	Marchio registrato Mac Dermid Inc., USA
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

--	--

Version 04.03.24/RH/LG0920



5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch