

# Advion<sup>®</sup> Cockroach Gel **Insektizid**

## Gebrauchsfertiges Köder-Gel zur Bekämpfung von Schaben für den Innen- und Aussenbereich.

<b>Produkt</b>	Advion Cockroach Gel ist ein Gel und enthält 0.6 g/100 g Indoxacarb
<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innen- und Aussenbereich von Liegenschaften.
<b>Wirkungsspektrum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtzeitige und umfassende Bekämpfung aller wichtigen Schabenarten (u.a. Orientalische Schabe, Deutsche Schabe, Amerikanische Schabe).</li> <li>- Für den Innen- und Außenbereich.</li> <li>- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe.</li> <li>- Äußerst attraktive Formulierung.</li> <li>- Wird durch Schabenzymen bioaktiviert.</li> </ul>
<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advion Cockroach Gel punktuell in kleinen Punkten ausbringen</li> <li>- Viele kleine Behandlungsstellen auf der Behandlungsfläche verteilt, sind effektiver als wenige Stellen mit grosser Menge</li> <li>- Advion Cockroach Gel sollte an Stellen appliziert werden, welche von den Schaben aufgesucht werden</li> <li>- Die Ausbringungen von Advion Cockroach Gel auf Flächen vermeiden, die kürzlich mit Insekten Repellentien behandelt wurden</li> <li>- Bereiche, die mit Advion Cockroach Gel behandelt wurden, dürfen nicht mit Insekten Repellentien behandelt werden</li> <li>- Köderstellen regelmässig auf Frass kontrollieren und bei Bedarf nachbehandeln</li> </ul> <p>Mindestens 2 Gel-Köderpunkte pro m<sup>2</sup> ausbringen (0,2 g/m<sup>2</sup> bis max. 2,5 g/m<sup>2</sup>). Eine höhere Anzahl Gelpunkte (bis zu 5 pro m<sup>2</sup>) kann bei starkem Schabenbefall, unter Bedingungen extremer Verschmutzung oder wenn es sich überwiegend um orientalische und amerikanische Schaben handelt, erforderlich sein.</p> <p>Um das Gel auszubringen, entfernen Sie die Kappe an der Düse und drücken Sie die Spitze der Düse auf die zu behandelnde Oberfläche. Drücken Sie langsam den Kolben, bis genügend Gel ausgetreten ist. Verschiessen Sie die Kartusche nach dem Beenden der Ausbringung.</p> <p>Frassköder mit akuter Lethalwirkung. Nach Fressen des Köders verenden die Schaben innerhalb von 24 bis 60 Stunden.</p> <p>Anwendungsbereiche</p>

## Technisches Merkblatt

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lebensmittel- und Futtermittellager</li><li>- Als punktuelle Behandlung in Wohnungen, Industriegebäuden, Büros, Lagern, Grossküchen, Krankenhäusern, Schulen, Pflegeheimen, Hotels, Bussen, Zügen, Flugzeugen, Einzelhandel und kommerziellen Einrichtungen</li><li>- Oder an geeigneten Gebäudestellen, die als Schaben-Behausung dienen</li><li>- In geeigneten Köderstationen oder ähnlichen Vorrichtungen, um sicher zu sein, dass keine Kleinkinder, Kinder, Haustiere und Nicht-Zielorganismen mit dem Produkt in Berührung kommen.</li></ul>
<b>Wirkungsweise</b>	<p>Advion Cockroach Gel dient der Bekämpfung von Schaben und ist wirksam gegen Adulte und Nymphen. Die leicht verzögerte Abtötung, verursacht durch den Wirkstoff Indoxacarb, erlaubt es den Schaben, das Gel aufzunehmen und in die Behausung zurückzukehren, wo sie andere Schaben mit dem Gel kontaminieren, was zu einer signifikanten Reduzierung des Befalls führt.</p>
<b>Beachten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ausschliesslich zum Gebrauch als Insektizid</li><li>- Ausschliesslich zum Gebrauch durch Schädlingsbekämpfer</li><li>- Geeignete Schutzkleidung tragen</li><li>- Nur zum Gebrauch in Bereichen, die für Kleinkinder, Kinder, Haustiere und Nicht-Zielorganismen unzugänglich sind</li><li>- Nicht in Bereichen ausbringen, wo Lebens-/Futtermittel verarbeitet werden und eine Kontamination dieser möglich ist</li><li>- Nicht in Bereichen behandeln, die regelmässig gereinigt werden, da dadurch das Gel entfernt wird</li><li>- Nicht in Abflüssen oder rund um Abflüsse anwenden, nicht in die Kanalisation gelangen lassen</li><li>- Keine Flächen behandeln, an denen die Temperatur 50°C überschreiten kann, da das Gel sonst flüssig wird und seine Wirksamkeit verliert (einige Beispiele, aber nicht ausschliesslich, sind: Teile von Öfen, Kaminen, Grills, Räucherhütten, Saunen, Heizlampen, Fritteusen, Geschirrspülern und Heisswasserrohren)</li><li>- Köder abdecken, um den Zugang von Nicht-Zielorganismen zu minimieren</li></ul> <p>Bewahren Sie Advion Cockroach Gel im Originalbehälter dicht verschlossen, kühl und trocken auf. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.</p> <p>Um dem Risiko einer Insektenresistenz vorzubeugen (entweder physiologisch oder verhaltensbedingt) wird empfohlen, Advion Cockroach Gel nicht als alleiniges Produkt im Schabenbekämpfungsprogramm zu verwenden. Dieses Produkt soll eher als Teil eines Bekämpfungsprogramms verwendet</p>

## Technisches Merkblatt

	werden, in dem ein weiteres Produkt mit einem anderen Wirkungsmechanismus als Indoxacarb, dem Wirkstoff des Advion Cockroach Gels, genutzt wird. Ob resistente Individuen vorhanden sind, ist vor dem Einsatz nur schwierig zu erkennen. Leu +Gygax AG und Syngenta übernehmen keinerlei Haftung für Verluste die, aus dem Misserfolg von Advion Cockroach Gel bei der Bekämpfung von resistenten Stämmen entstehen.
<b>Mischbarkeit</b>	Advion Cockroach Gel lässt sich nicht mit anderen Produkten mischen.
<b>Einstufung</b>	Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten.
<b>Umweltverhalten</b>	---
<b>Verpackung</b>	4 x 30 g
®	reg. Warenzeichen der Syngenta AG, Basel
<b>Zur Beachtung</b>	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 06.11.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)