


Amilon 5TM

Molluskizid

Granuliertes Schneckenkorn für den Feld-, Obst-, Wein-, Gemüse- und Zierpflanzenbau.

Produkt	Amilon 5 TM ist ein (RB) Fertigmödel und enthält 5 % Metaldehyd. (W-7083)
Anwendungsbereich	Beerenbau (B), Feldbau (F), Gemüsebau (G), Obstbau (O), Weinbau (W), Zierpflanzen (Z).
Wirkungsspektrum	Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten.
Anwendung	
Beerenbau	Beerenbau allg.: 7kg/ha, gegen <i>Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten</i> . Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Behandlungen beträgt mindestens 14 Tage. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere von Produktpackungen fernhalten. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats.
Obstbau	Obstbau allg.: 7kg/ha, gegen <i>Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten</i> . Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Behandlungen beträgt mindestens 14 Tage. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere von Produktpackungen fernhalten. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats.
Weinbau	Reben: 7kg/ha, gegen <i>Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten</i> . Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Das Zeitintervall zwischen

<p>Gemüsebau</p>	<p>zwei aufeinanderfolgenden Behandlungen beträgt mindestens 14 Tage. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere von Produktpackungen fernhalten. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats.</p> <p>Gemüsebau allg.: 7kg/ha, gegen <i>Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten</i>. Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Behandlungen beträgt mindestens 14 Tage. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere von Produktpackungen fernhalten. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats.</p>
<p>Feldbau</p>	<p>Feldbau allg.: 7kg/ha, gegen <i>Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten</i>. Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Behandlungen beträgt mindestens 14 Tage. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere von Produktpackungen fernhalten. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats.</p>
<p>Zierpflanzenbau</p>	<p>Zierpflanzen allg.: 7kg/ha, gegen <i>Ackerschnecken/Deroceras Arten, Wegschnecken/Arion Arten</i>. Auf den Boden zu streuen. Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Behandlungen beträgt mindestens 14 Tage. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln Produkt nicht in Häufchen auslegen. Verschüttetes Granulat sofort zusammenkehren und entfernen. Mittel ist giftig für Haustiere. Haustiere von Produktpackungen fernhalten. Zum Schutz von wildlebenden Säugern und Vögeln nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Kein manuelles Ausbringen des Granulats.</p>

Wirkungsweise	Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, Metaldehyd wirkt bei Schnecken auf den Verdauungsapparat. Bei genug grosser Wirkstoffmenge, wird die Wirkung irreversibel, die Symptome sind erhöhte Schleimproduktion, anschliessend tritt die Lähmung und Tod der Tiere ein.
Herstellung Spritzbrühe	Amilon 5 muss mit einem Granulatstreuer verteilt werden. Mischbarkeit: --- Anwenderschutz: Befüllen der Maschinen mit dem Granulat: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Ausbringen des Granulats: Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabinen) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.
Nachbau	---
Einstufung	Achtung  P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für den berufsmässigen Verwender. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	25 kg
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 20.02.25/RH/LG0000