



Asulam LG

Herbizid

Herbizid gegen Blacken und Farne in Wiesen, Weiden und Obstanlagen

Produkt	Asulam ist ein Wasserlösliches Konsentrat und enthält 33.2 % (400 g/l) Asulam.
Anwendungsbereich	Kern-, Steinobst, Wiesen und Weiden.
Wirkungsspektrum	Gegen Sumpflättriger Ampfer (Blacken), Adlerfarn, Wurmfarn.
Anwendung Obstbau	Kern-, Steinobst: 3-4 lt/ha gegen <i>Stumpflättriger Ampfer (Blacken)</i> . Keine Behandlungen im Hochsommer (Mitte Juni bis Ende August). Die Behandlung ist nach Austrieb oder nach einem ersten Schnitt vor der Bildung der Blütentriebe durchzuführen. Keine Anwendung in Beständen mit blühenden Pflanzen.
Feldbau	<p>Wiesen und Weiden: 6 lt/ha, gegen <i>Adler- und Wurmfarn</i>. Wartefrist: 3 Woche(n). Keine Behandlungen im Hochsommer (Mitte Juni bis Ende August). Die Behandlung ist nach Austrieb oder nach einem ersten Schnitt vor der Bildung der Blütentriebe durchzuführen. Keine Anwendung in Beständen mit blühenden Pflanzen. Mit Motor- oder Rückenspritze in 500-1500 L Wasser, mit Rückennebelblaser in 250-400 L Wasser. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen.</p> <p>6-8 lt/ha, gegen <i>Alpenampfer</i>. Wartefrist: 3 Woche(n). Keine Behandlungen im Hochsommer (Mitte Juni bis Ende August). Die Behandlung ist nach Austrieb oder nach einem ersten Schnitt vor der Bildung der Blütentriebe durchzuführen. Keine Anwendung in Beständen mit blühenden Pflanzen. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen. Flächenbehandlung.</p> <p>3-4 lt/ha, gegen <i>Sumpflättriger Ampfer (Blacken)</i>. Wartefrist: 3 Woche(n). Keine Behandlungen im Hochsommer (Mitte Juni bis Ende August). Die Behandlung ist nach Austrieb oder nach einem ersten Schnitt vor der Bildung der Blütentriebe durchzuführen.</p>

Technisches Merkblatt

	Keine Anwendung in Beständen mit blühenden Pflanzen. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen.
Wirkungsweise	Asulam LG ist ein systemisches Herbizid, das gegen Blacken und Farne wirkt. Wertvolle Futterkräuter und Leguminosen (Klee, Luzerne) werden ebenso geschont. Der Wirkstoff wird in wenigen Stunden vom Blatt aufgenommen und in der ganzen Pflanze verteilt. Die ersten Anzeichen der Wirkung sind ca. 2 Wochen nach der Behandlung an Bleichungen und Wuchshemmungen erkennbar. Behandelte Bestände können nach 3 Wochen geschnitten werden, bei Galttieren beträgt die Wartefrist 2 Wochen. Die Blacken sterben erst nach dem Schnitt ab. Eine gute Nährstoffversorgung (z.B. Zusatz von Flüssigdünger LG) fördert die Entwicklung der gewünschten Futterpflanzen und führt zu einer schnellen Schliessung der hinterlassenen Bestandeslücken. Wertvolle Futtergräser vertragen Asulam LG im Allgemeinen gut. Wenig erwünschte Arten wie Gemeine und Einjährige Rispe, Flechtstraussgras und Wolliges Honiggras können empfindlich reagieren.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. Mischbarkeit: Asulam LG ist mischbar mit unseren Pflanzendüngern.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Achtung   Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. Produkt ist kein Bienengift.

Technisches Merkblatt

Verpackung	5 lt.
®	---
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 16.01.17/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch