



Asulam LG

Erbicida

Erbicida contro i romici e le felci nei pascoli, prati da falciare e in frutticoltura.

Prodotto	Asulam LG è una sospensione concentrata (SC) e contiene 33.2 % (400 g/l) Asulame. (W-6997-4)
Colture	Campicoltura, Frutticoltura.
Spettro di efficacia	Romice comune, Felce maggiore, Felce maschio, Romice alpino.
Applicazione Frutticoltura	Frutta a granelli, Frutta a nocciolo: 3-4 lt/ha, contro <i>Romice comune</i> . Nessun trattamento in piena estate (da metà giugno a fine agosto). Effettuare il trattamento dopo il germogliamento o dopo una primo sfalcio, prima della formazione di germogli fioriti. Non utilizzare in presenza di piante in fiore.
Campicoltura	<p>Prati e pascoli: 6 lt/ha, contro <i>Felce maggiore, Felce maschio</i>. Termine d'attesa: 3 settimane. Effettuare il trattamento dopo il germogliamento o dopo una primo sfalcio o pascolo, prima della formazione di germogli fioriti. Non utilizzare in presenza di piante in fiore. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Con motoirroratrice o vaporizzatore a zaino in 500 - 1500 l di acqua, con nebulizzatore a zaino in 250 - 400 l di acqua.</p> <p>Prati e pascoli: 6-8 lt/ha, contro <i>Romice alpino</i>. Termine d'attesa: 3 settimane. Effettuare il trattamento dopo il germogliamento o dopo una primo sfalcio o pascolo, prima della formazione di germogli fioriti. Non utilizzare in presenza di piante in fiore. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Trattamento su tutta la superficie. Nessun trattamento in piena estate (da metà giugno a fine agosto).</p> <p>Prati e pascoli: 3-4 lt/ha, contro <i>Romice comune</i>. Termine d'attesa: 3 settimane. Effettuare il trattamento dopo il germogliamento o dopo un primo sfalcio o pascolo, prima della</p>

	<p>formazione di germogli fioriti. Non utilizzare in presenza di piante in fiore. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Con motoirroratrice o vaporizzatore a zaino in 500 - 1500 l di acqua, con nebulizzatore a zaino in 250 - 400 l di acqua.</p>
Modalità di azione	<p>Asulam LG è un erbicida sistemico efficace contro i romici e la felce imperiale. Le piante foraggere (graminacee) e le leguminose (trifoglio e erba medica) non vengono colpite. La materia attiva, è assorbita subito dopo l'applicazione e trasportata in tutta la pianta. I primi segni scolorazione, crescita diminuita della pianta, sono visibili dopo 2 settimane circa dal trattamento. Periodo d'attesa dopo il trattamento per sfalciare o pascolare un prato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le mucche in lattazione : 3 settimane • Per il bestiame non in lattazione (mucche coperte, manze, bestiame all'ingrasso, etc.) : 2 settimane <p>I romici, deperiscono solamente dopo lo sfalcio. Una buona gestione di apporto di concimi, ad es. L'applicazione di concimi fogliari, favoriscono la crescita delle piante foraggere e impediscono lo sviluppo delle lacune vegetali attorno ai luoghi trattati.</p> <p>In generale, le piante foraggere (graminacee) mostrano una buona tolleranza verso Asulam LG. Alcune specie foraggere, piuttosto non desiderate, come l'agrostide e l'erba bombagiona, possono risultare sensibili.</p>
Preparazione della poltiglia	<p>Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.</p> <p>Miscibilità: Asulam LG è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.</p> <p>Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.</p>
Rotazione delle colture	---
Classificazione	<p>Attenzione</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le</p>

Scheda Tecnica



	<p>istruzioni per l'uso.</p> <p>H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.</p> <p>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.</p> <p>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 lt
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 11.03.25/RH/RF/LG0593



5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch