


Bacchus®

Fungicida

Fungicida combinato per la viticoltura.

Prodotto	Bacchus® è una sospensione concentrata (SC) e contiene 14.8 % 190 g/l Rame (sotto forma di ossisolfato) e 2.7 % 35 g/l di Cimoxanil.
Colture	Viticultura
Spettro di efficacia	Peronospora della vite.
Applicazione Viticoltura	<p>Vite: 0.3% (4.8 lt/ha), contro <i>Peronospora della vite</i>.</p> <p>Applicazione: dopo la fine della fioritura, al più tardi entro metà agosto. Anche per applicazione per via aerea. Non conservare il prodotto a temperature al sotto di 0°C. Al massimo 4 kg di rame-metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro (bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG.</p>
Modalità di azione	Bacchus, è una combinazione di un prodotto di contatto e di uno sistemico. La materia attiva cymoxanil, penetra nel tessuto vegetale e protegge le parti verdi della pianta, dall'interno verso l'esterno. L'ossisolfato di rame, aderisce alla pianta e forma un rivestimento di protezione fungicida. Esso inibisce la germinazione delle spore e la crescita del micelio, alterando il sistema respiratorio del fungo.
Preparazione della poltiglia	<p>Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.</p> <p>Miscibilità: Bacchus® è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.</p> <p>Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di</p>

	<p>protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.</p> <p>Lavori successivi in colture trattate devono essere effettuati al più presto 48 ore dopo l'applicazione del prodotto. Indossare guanti + indumenti protettivi nelle 48 ore seguenti.</p>
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	<p>Attenzione</p>  <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	10 lt.
®	Marchio registrato Leu+Gygax SA Svizzera
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 22.03.21/RH/RF/LG0000



5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
 3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch