

Blackex

MCPA / Dicamba



- **Blattwirkung, Pflanze stirbt wurzeltief ab**
- **Mischung für Streich-, Tupf- und Spritzgerät**
- **Rot eingefärbte Formulierung**



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

 **Leu+Gygax AG**

Wirkungsspektrum

Blacken, Hahnenfuss, Wegerich, Löwenzahn, Brennessel, Bärenklau, Kerbel, u.v.a.



Produktprofil

Formulierung: SL - Wasserlösliches Konzentrat

Wirkstoff: MCPA 8.57 % (90 g/l)
Dicamba 0.952 % (10 g/l)

GHS-Einstufung:



GHS 09

Wirkungsweise

Der Wirkstoff Dicamba wirkt über die Wachstumszone der grünen Pflanzenteile, besitzt aber auch eine Residualwirkung über die Wurzeln. Der Wirkstoff MCPA wirkt auf die Streckungszone der Unkräuter und führt zu einer unregelmässigen Streckung der Pflanzen. Beide Substanzen regen die Unkräuter zu einem unregelmässigen Wachstum an, was schliesslich zu ihrem Absterben führt.

Anwendung

Wiesen- und Weiden:

gegen *einjährige und mehrjährige Unkräuter*. Wartefrist: 3 Woche(n). Anwendung: Gebrauchsfertige Mischung für Streich-, Tupf- und Spritzgeräte. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen. Einzelpflanzenbehandlung. Unkräuter sind im vollen Wachstum und bevor sie Samenträger bilden zu behandeln.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.

Mischbarkeit

Gebrauchsfertige Mischung.
Mit Rückenspritze verdünnen möglich.
1 Teil Blackex, 2 Teile Wasser).