

# Blackex

MCPA / Dicamba



- **Effetto fogliare, la pianta muore fino alle radici**
- **Miscela per spargere, tamponare e spruzzare**
- **Formulazione di colore rosso**



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)

 **Leu+Gygax SA**

## Spettro d'azione

Romici, ranuncolo, piantaggine maggiore, dente di leone, ortica, panacea, cerfoglio bulboso e altre.



## Profilo del prodotto

Formulazione: SL - concentrato solubile in acqua

Principio attivo: MCPA 8.57 % (90 g/l)  
Dicamba 0.952 % (10 g/l)

Classificazione GHE:



GHS 09

## Modalità d'azione

La materia attiva Dicamba agisce nelle zone di crescita delle piante. Esso ha pure un effetto residuale e sulle radici. La materia attiva MCPA, agisce nella zona di estensione delle avventizie e porta ad un allungamento irregolare delle piante. Ne esce, così una crescita incontrollata della pianta, la quale conduce alla morte della stessa.

## Applicazione

### Prati e pascoli:

contro *Malerbe dicotiledoniannuali e pluriennali*. Termine d'attesa: 3 settimane. Applicazione: miscela pronta all'uso con apparecchi per umettazione, con effetto di tamponamento e per irroratrici. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Trattamento pianta per pianta. Trattare le malerbe in piena crescita e prima che si formino dei semi.

Utilizzate i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'utilizzazione leggere le etichette e le informazioni concernente il prodotto.

## Miscibilità

Miscela pronta all'uso. Il prodotto può essere diluito per l'applicazione a mano o con un irroratore a spalla. (1 parte di Blackex, 2 parti di acqua).