

Bogard®

Difeoconazol



- **breites Spektrum**
- **schnelle Wirkung mit Langzeitwirkung**
- **präventive, systemische und heilende Aktivität**



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

 **Leu+Gygax AG**

Wirkungsspektrum

Alternaria, Birnengitterrost, Blattfleckenpilze, Blattschwärze, Braunrost, Cercospora, Falscher Mehltau, Gelbrost, Gummistängelkrankheit, Krätze, Kräuselkrankheit, Marssonina, Monilia, Ramularia, Rostpilze, Rotbrenner, Samtfleckenkrankheit, Schrotschuss, Schwarzfäule, Septoria, Sprühfleckenkrankheit, Stängelfäule, Sternrusstau, Wurzelfäule.



Produkteprofil

Formulierung: EC - Emulsionskonzentrat

Wirkstoff: Difenoconazol 23.5% (250 g/l)

GHS-Einstufung:

Gefahr



GHS 07

GHS 08

GHS 09

Wirkungsweise

Bogard[®] mit dem Wirkstoff Difenoconazole ist ein Fungizid aus der Gruppe der Triazole. Der Wirkmechanismus ist die Verhinderung der Sterolbiosynthese. Difenoconazole greift gezielt in das Wachstum des Keimschlauches und das Hyphenwachstum von Pilzen ein. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt es zu einem Kollaps der Pilzstrukturen. Durch diesen Effekt werden die Pilze in ihrer Ausbreitung sicher gestoppt.

Anwendung

Beerenbau:	0.05 % (0.5 lt/ha), gegen <i>Echten Mehltau</i> , <i>Rost</i> .
Obstbau:	0.24-0.48 lt/ha, gegen <i>Echten Mehltau</i> , <i>Rost</i> , <i>Fruchtmonilia</i> , <i>Schrotschuss</i> , <i>Birnengitterrost</i> , <i>Blüten und Zweigdürre</i> , <i>Schorf</i> , <i>Sprühfleckenkrankheit</i> , <i>Kräuselkrankheit</i> .
Weinbau:	0.0125 %, gegen <i>Echten Mehltau der Rebe</i> , <i>Rotbrenner</i> , <i>Schwarzfäule der Rebe</i> .
Gemüsebau:	0.05 % (0.5 lt/ha), gegen <i>Alternaria spp.</i> , <i>Echter Mehltau</i> , <i>Puccinia spp.</i> , <i>Marssonina-Blattfleckenkrankheit</i> , <i>Gummistängelkrankheit</i> , <i>Alternaria Purpurfleckenkrankheit</i> , <i>Rost</i> , <i>Samtfleckenkrankheit</i> , <i>Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten</i> , <i>Blattfleckenpilze</i> , <i>Septoria-Blattfleckenkrankheit</i> , <i>Blattschwärze</i> .
Feldbau:	0.5 lt/ha, gegen <i>Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten</i> , <i>Alternaria-Dürrfleckenkrankheit</i> , <i>Wurzelhals- und Stengelfäule</i> , <i>Braunrost</i> , <i>Echter Mehltau des Getreides</i> , <i>Gelbrost</i> .
Zierpflanzenbau:	0.05 %, gegen <i>Blattfleckenpilze</i> , <i>Blüten- und Zweigdürre</i> , <i>Echter Mehltapilz der Zierpflanzen</i> , <i>Rostpilze der Zierpflanzen</i> , <i>Sternrusstau der Rosen</i> .

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produkteinformationen lesen.

Mischbarkeit

Bogard[®] ist mit unseren Fungiziden, Insektiziden und Blattdüngern mischbar. Mischbrühen sofort verwenden.