


# Captan 80 WDG

Fungicida

## Fungicida organico per la lotta contro le malattie crittogamiche in frutticoltura.

<b>Prodotto</b>	Captan 80 WDG è un granulato idrodispersibile (WG) e contiene 80 % Captano. (W-6635)
<b>Colture</b>	Frutticoltura
<b>Spettro di efficacia</b>	Antracnosi del ciliegio, Cilindrosporiosi del ciliegio, Vaiolatura della frutta a nocciolo, Marciume lenticellare delle mele, Ticchiolatura tardiva del melo, Ticchiolatura della frutta a granelli.
<b>Applicazione Frutticoltura</b>	<p><b>Ciliegio:</b> 0.15% (2.4 kg/ha), contro <i>Antracnosi del ciliegio</i> <i>Cilindrosporiosi del ciliegio</i>. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG. Per proteggere le acque sotterranee al massimo 10 applicazioni complessive per particella e anno con prodotti contenenti captano. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.</p> <p><b>Frutta a nocciolo:</b> 0.15% (2.4 kg/ha), contro <i>Vaiolatura della frutta a nocciolo</i>. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG. Per proteggere le acque sotterranee al massimo 10 applicazioni complessive per particella e anno con prodotti contenenti captano. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.</p> <p><b>Melo:</b> 0.15% (2.4 kg/ha), contro <i>Marciume lenticellare delle mele</i>, <i>Ticchiolatura tardiva del melo</i>. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di</p>

	<p>10'000 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG. Per proteggere le acque sotterranee al massimo 10 applicazioni complessive per particella e anno con prodotti contenenti captano. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.</p> <p><b>Melo, Pero / Nashi:</b> 0.15% (2.4 kg/ha), contro <i>Ticchiolatura della frutta a granelli</i>. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m<sup>3</sup>/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG. Per proteggere le acque sotterranee al massimo 10 applicazioni complessive per particella e anno con prodotti contenenti captano. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.</p>
<b>Modalità di azione</b>	<p>Il Captan, è un fungicida di contatto e deve essere applicato preventivamente. Esso impedisce la germinazione delle spore e l'accrescimento del micelio. Il Captan blocca la respirazione e provoca il deperimento delle cellule.</p>
<b>Preparazione della poltiglia</b>	<p>Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.</p> <p><b>Miscibilità:</b> Captan 80 WDG è miscibile con i nostri insetticidi.</p> <p><b>Protezione dell'utente:</b> Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.</p>
<b>Rotazione delle colture</b>	<p>Nessuna restrizione.</p>
<b>Classificazione</b>	<p>Attenzione</p> 

	<p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p> <p>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.</p> <p>H319 Provoca grave irritazione oculare.</p> <p>H351 Sospettato di provocare il cancro.</p> <p>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.</p> <p>SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
<b>Comportamento nell'ambiente</b>	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
<b>Imballaggio</b>	1 kg.      5 kg.      20 kg.
®	
<b>Osservazioni</b>	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 01.04.22/RH/RF/LG0000



5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45  
 3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)