



# Cargo

Fungizid

## Kontaktfungizid mit langanhaltender Wirkung für den Feld-, Wein- Gemüse- und Zierpflanzenbau.

<b>Produkt</b>	Cargo ist ein Suspensionskonzentrat und enthält 40% Chlorothalonil (500 g/l).
<b>Anwendungsbereich</b>	Weizen, Gerste, Kartoffeln, Reben, Tomaten, Auberginen, Karotten, Zwiebeln, Knollensellerie, Spargeln, Champignons, Zierpflanzen, Zier- und Sportrasen, Chrysantheme, Iris und Nelken.
<b>Wirkungsspektrum</b>	Spelzenbräune, Sprenkelnekrosen (=Pollenflecken) (PLS+RCC), Kraut- und Knollenfäule, Schwarzfleckenkrankheit, Rotbrenner, Falscher Mehltau, Alternaria, Phytophthora, Septoria, Blattschwärze, Verticillium, Rostpilze, Blattfleckenkrankheiten, Nelkenschwärze, Tintenkrankheit, pathogene Bodenpilze.
<b>Anwendung</b> <b>Weinbau</b>	<b>Reben:</b> 0.3 %, gegen <i>Falscher Mehltau der Rebe</i> , <i>Rotbrenner</i> , <i>Schwarzfleckenkrankheit der Rebe</i> . Anwendung: Vor der Blüte.
<b>Gemüsebau</b>	<b>Aubergine, Tomaten:</b> 0.3 %, gegen <i>Alternaria-Dürrfleckenkrankheit</i> , <i>Kraut- und Fruchtfäule</i> , <i>Septoria-Blattfleckenkrankheit der Tomate/Aubergine</i> . Wartefrist: 3 Woche(n). <b>Karotten:</b> 0.3 %, gegen <i>Alternaria-Möhrenschwärze</i> . Wartefrist: 3 Woche(n). <b>Knollensellerie:</b> 0.3 %, gegen <i>Septoria-Blattfleckenkrankheit des Selleries</i> . Wartefrist: 3 Woche(n). <b>Spargel:</b> 0.3 %, gegen <i>Blattschwärze der Spargel</i> . <b>Speisepilze (Champignonkulturen):</b> 4.5ml/m <sup>2</sup> , gegen <i>Trockene Molle</i> . Anwendung: Nach dem Decken giessen. In 2 lt. Wasser. Dosierung gilt für schwarze Torferde. <b>Zwiebeln:</b> 0.3 %, gegen <i>Falscher Mehltau der Zwiebel</i> . Wartefrist: 3 Woche(n).
<b>Feldbau</b>	<b>Wintergerste:</b> 1.5 lt/ha, gegen <i>Sprenkelnekrosen (PLS+RCC)</i> . Anwendung: Stadium 39-51 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. PLS+RCC = Physiological Leaf Spots und <i>Ramularia collo-cygni</i> .

<b>Zierpflanzenbau</b>	<p><b>Kartoffeln:</b> 3 lt/ha, gegen <i>Alternaria-Dürrfleckenkrankheit (0) Kraut- und Knollenfäule</i>. Wartefrist: 3 Woche(n). Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Erste Behandlung wenn sich die Stauden in den Reihen berühren. Bei Frühkartoffeln 2 Wochen Wartefrist.</p> <p><b>Weizen:</b> 3 lt/ha, gegen <i>Spelzenbräune und Braunfleckigkeit (S. nodorum)</i>. Anwendung: Stadium 57-61 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.</p> <p><b>Zierpflanzen allg.:</b> 0.3%, gegen <i>Rostpilze</i>.</p> <p><b>Chrysantheme:</b> 0.2%, gegen <i>Blattfleckenkrankheit der Chrysantheme</i>.</p> <p><b>Iris:</b> 0.2%, gegen <i>Tintenkrankheit der Iris</i>.</p> <p><b>Nelken:</b> 0.2%, gegen <i>Nelkenschwärze</i>.</p> <p><b>Zier und Sportrasen:</b> 0.3%, gegen <i>Krankheiten durch pathogene Bodenpilze</i>.</p>
<b>Wirkungsweise</b>	<p>Cargo ist ein Kontaktfungizid und sein Wirkstoff bildet auf dem Blatt einen schützenden Belag. Der Wirkstoff Chlorothalonil hemmt enzymatische Reaktionen in den Pilzsporen und verhindert die Sporenkeimung unabhängig von der Temperatur.</p>
<b>Herstellung Spritzbrühe</b>	<p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge <b>Produkt</b> beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p> <p><b>Mischbarkeit:</b> Cargo ist mit unseren Insektiziden mischbar.</p>
<b>Nachbau</b>	<p>Keine Einschränkung</p>
<b>Einstufung</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>R 37-40-41-43-50/53; S 02-26-35-36/37/39-46-57; SP 1</p>
<b>Umweltverhalten</b>	<p>Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.</p> <p><b>Produkt</b> ist kein Bienengift.</p>
<b>Verpackung</b>	<p>1 lt. 5lt.</p>
<b>Zur Beachtung</b>	<p>Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.</p>