


Condoral™ SC

Herbizid

Herbizid zur Bekämpfung von Samenunkräuter und Ungräser in Kartoffeln, Karotten, Spargeln und Tomaten.

Produkt	Condoral SC ist ein Suspensionskonzentrat und enthält 52,2 % (600 g/l) Metribuzin
Anwendungsbereich	Feldbau: Speisekartoffeln, Saatkartoffeln, Industriekartoffeln (ohne Frühkartoffeln). Gemüsebau: Spargeln (Junganlagen und Ertragsanlagen), Karotten (ohne Pfälzer), Tomaten im Freiland.
Wirkungsspektrum	Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Hirsen, Rispengräser, Amaranth, Kamillen, Melden, Zweizahn, Hirtentäschel, Erdrauch, Hohlzahn, Franzosenkraut, Storchenschnabel, Taubnessel, Bingelkraut, Vergissmeinnicht, Mohn, Knöterich, Kreuzkraut, Senf, Vogelmiere, Ehrenpreis, Stiefmütterchen u.v.a.
Anwendung Gemüsebau	<p>Karotten: 0.35lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Stadium 10-16 (BBCH). Splitbehandlung (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge). 0.3 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Stadium 10-16 (BBCH). Aufwandmenge bei einmaliger Behandlung.</p> <p>Spargel (Junganlagen): 0.75 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Vor dem Durchstossen. 7-10 Tage nach der Pflanzung.</p> <p>Spargel: 0.75 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Wartefrist: 7 Tage Anwendung: Nach dem Aufrichten der Dämme vor der Stechperiode.</p> <p>0.75 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Nach der Stechperiode. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene unbehandelte Pufferzone von mindestens 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Ausnahmen sind in den Weisungen des BLW festgelegt.</p>

Feldbau	<p>Tomaten: 0.5 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: 7-10 Tage nach der Pflanzung.</p> <p>Kartoffeln: 0.5-0.75 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Voraufbau. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene unbehandelte Pufferzone von mindestens 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Ausnahmen sind in den Weisungen des BLW festgelegt. Niedrige Aufwandmenge nur in Tankmischung gemäss den Angaben der BewilligungsinhaberIn. Splitbehandlungen möglich.</p> <p>Speise- und Futterkartoffeln: 0.5 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Nachaufbau, bis 5 cm Staudenhöhe. Splitbehandlungen möglich. Die Aufwandmenge im Vor- und Nachaufbau darf insgesamt 540 g Metribuzin/ha pro Kultur nicht überschreiten. Nachbau anderer Kulturen: 16 Wochen Wartefrist. In Tankmischung mit Boxer (4-4.5 l/ha). Nicht bei Frühkartoffeln anwenden. Sortenempfindlichkeit gemäss den Angaben der BewilligungsinhaberIn beachten.</p> <p>0.3-0.6 lt/ha, gegen <i>einjährige Einkeimblättrige Ungräser und einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter</i>. Anwendung: Früher Nachaufbau. 7. Splitbehandlungen möglich. Die Aufwandmenge im Vor- und Nachaufbau darf insgesamt 540 g Metribuzin/ha pro Kultur nicht überschreiten. Nachbau anderer Kulturen: 16 Wochen Wartefrist. Niedrige Aufwandmenge bei empfindlicheren Sorten oder als Nach- bzw. Korrekturbehandlung zum Voraufbaueinsatz eines Herbizids. Nicht bei Frühkartoffeln anwenden. Sortenempfindlichkeit gemäss den Angaben der BewilligungsinhaberIn beachten.</p> <p>Gefahrenkennzeichnungen:</p>
Wirkungsweise	<p>Condoral SC ist ein breitwirksames Herbizid mit Blatt- und Wurzelwirkung und erfasst sowohl keimende wie auch bereits aufgelaufene einjährige Samenunkräuter und Ungräser. Die Wirkung gegen Kleber und mehrjährige Ungräser und Unkräuter sind ungenügend. In Moorböden mit mehr als 6 % Humusgehalt erfolgt die Anwendung am besten auf aufgelaufene Unkräuter. Eine genügende Bodenfeuchtigkeit fördert die Wirkung.</p>
Herstellung Spritzebrühe	<p>Spritzebrühe zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritzebrühe bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p>

	<p>Mischbarkeit: Im Kartoffelbau ist Condoral SC gut mischbar mit Racer CS. Bezüglich Herbizid-Mischpartner in Karotten verlangen Sie bitte unsere Beratung. Bei Mischungen sind die Vorschriften der anderen Produkte ebenfalls zu berücksichtigen.</p>
Nachbau	<p>Unter normalen Bedingungen können Folgekulturen nach 16 Wochen angebaut werden, unter der Voraussetzung, dass der Boden vor der Neubestellung tief gepflügt und gründlich durchgearbeitet wird. Bei Mischungen sind die Vorschriften der anderen Produkte ebenfalls zu berücksichtigen.</p>
Einstufung	<p>Achtung</p>  <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 208 Enthält [<i>Metribuzin</i>]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.</p>
Umweltverhalten	<p>Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. Produkt ist kein Bienengift.</p>
Verpackung	1 lt.
®	
Zur Beachtung	<p>Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.</p>

Version 10.01.17/RH