


# Cymbal® WG

Fungicida

## Fungicida parzialmente sistemico contro malattie da fungo nelle patate e in viticoltura.

<b>Prodotto</b>	Cymbal® WG è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 45 % Cimoxanil. (W-7534-2)
<b>Colture</b>	Campicoltura, viticoltura.
<b>Spettro di efficacia</b>	Peronospora della vite, peronospora della patata.
<b>Applicazione Viticoltura</b>	<b>Vite:</b> 0.016 %, (0.25kg/ha), contro <i>peronospora della vite</i> . Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m <sup>3</sup> /ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Soltanto in combinazione con 0.1% di Folpet. Al massimo 4 trattamenti per anno con prodotti contenenti cimoxanil.
<b>Campicoltura</b>	<b>Patate:</b> 0.25kg/ha, contro <i>peronospora della patata</i> . Termine d'attesa: 2 settimane. Applicazione: trattamento fogliare. 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme. Termine di attesa di una settimana per le patate primaticce. Intervalli di 7 - 10 giorni tra i trattamenti. In combinazione con 0.4 l/ha Ibiza SC.  <b>Patate:</b> 0.25kg/ha, contro <i>peronospora della patata</i> . Termine d'attesa: 2 settimane. Applicazione: trattamento fogliare. 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme. Termine di attesa di una settimana per le patate primaticce. Intervalli di 7 - 10 giorni tra i trattamenti. In combinazione con 0.5 l/ha Ranman Top.
<b>Modalità di azione</b>	La materia attiva Cimoxanil, è un fungicida con un effetto penetrante. Esso agisce brevemente e preventivamente attraverso un contatto delle spore germinate, e curativa (bloccando) nel

	<p>tessuto della pianta la crescita del fungo come pure diminuendo la formazione delle spore. Cymbal WG frena la formazione del fungo durante la sua incubazione e può di conseguenza ancora bloccare infezioni fresche fino 48 ore dopo l'infezione (specialmente quelle di peronospora nelle patate). La materia attiva Cymoxanil viene suddivisa all'interno della pianta in modo translaminare (protezione della faccia inferiore della foglia) e sistemico locale (ripartita nella foglia trattata).</p>
<b>Preparazione della poltiglia</b>	<p>Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.</p> <p><b>Miscibilità:</b> Cymbal è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.</p> <p><b>Protezione dell'utente:</b> Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Utilizzazione professionale: lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.</p>
<b>Rotazione delle colture</b>	Nessuna restrizione.
<b>Classificazione</b>	<p>Attenzione</p>  <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.          EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.          H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.          H319 Provoca grave irritazione oculare.          H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.          H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.          H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.          SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
<b>Comportamento nell'ambiente</b>	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
<b>Imballaggio</b>	1 kg.
®	Marchio registrato Belchim Crop Protection, Belgien

<b>Osservazioni</b>	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.
---------------------	--

Version 12.03.24/RH/RF/LG1135



5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)