

# Cyrano<sup>®</sup>

## Fungizid

### Kombiniertes Fungizid gegen Krankheiten im Weinbau. Wirkt protektiv und systemisch.

<b>Produkt</b>	Cyrano ist ein wasserdispergierbares Granulat und enthält 50% Fosetyl-Al, 4% Cymoxanil und 25% Folpet.
<b>Anwendungsbereich</b>	Weinbau.
<b>Wirkungsspektrum</b>	Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Teilwirkung), Rotbrenner (Nebenwirkung), Graufäule ( <i>Botrytis</i> sp.) (Teilwirkung), Schwarzfäule (Teilwirkung).
<b>Anwendung</b>	<b>Reben:</b> 0.2 - 0.25 % (3.2 - 4 kg/ha), gegen <i>Falscher Mehltau der Rebe</i> . Teilwirkung: <i>Echter Mehltau der Rebe</i> , <i>Graufäule (Botrytis cinerea)</i> , <i>Schwarzfäule der Rebe</i> . Nebenwirkung: <i>Rotbrenner</i> . Wartefrist: 28 Tage. Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August. Auch für die Luftapplikation. Die höchste Dosis nur für die Luftapplikation. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühemenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m <sup>3</sup> pro ha. Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Zum Schutz vor den Folgen einer Abschwemmung eine mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsene Pufferzone von mindestens 6 m einhalten. Reduktion der Distanz aufgrund von Drift und Ausnahmen gemäss den Weisungen des BLW. Bei der Beimischung von Kupferpräparaten besteht die Gefahr von Blattverbrennungen. Die Bewilligungsinhaberin ist zu konsultieren.
<b>Wirkungsweise</b>	Der Wirkstoff Fosetyl-Al dringt ins Gewebe ein und wird in den Leitungsbahnen nach oben und unten transportiert. Er hat eine direkte Wirkung auf den Pilz und stimuliert andererseits die natürlichen Abwehrkräfte der Rebe. Cymoxanil wird gleichmässig im Pflanzengewebe verteilt und wirkt sowohl vorbeugend als auch noch 1-2 Tage nach einer erfolgten Infektion (kurativ). Der Wirkstoff Folpet wirkt auf dem Blatt als Kontaktfungizid. Er beeinflusst die Atmung der Pilze und hemmt die Sporenkeimung und das Mycelwachstum.

## Technisches Merkblatt

<b>Herstellung Spritzbrühe</b>	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge <b>Produkt</b> beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. <b>Mischbarkeit:</b> Cyrano ist mit Strobry oder Vivando mischbar. Mischbrühen sind sofort auszubringen. Nicht mit Kupferpräparaten mischbar, Gefahr von Blattverbrennungen.
<b>Nachbau</b>	Keine Einschränkung
<b>Einstufung</b>	Achtung; GHS07, GHS08,GHS09; EUH 208, EUH 401; H319, H351, H410; SP 1.
<b>Umweltverhalten</b>	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. <b>Produkt</b> ist kein Bienengift.
<b>Verpackung</b>	5 kg.
®	Reg. Marke der Bayer AG, Leverkusen, BRD
<b>Zur Beachtung</b>	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 01.12.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)