

# Duplosan® KV Combi

**Wachsstoff-Herbizid für den Obst-, Feld-, Zierpflanzenbau sowie für Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV).**



- ✓ **Sehr breites Wirkungsspektrum auf die wichtigsten Ackerunkräuter wie Winden, Disteln, Klebern und v.a.**
- ✓ **Anwendung bis Stadium BBCH 30.**
- ✓ **Einsetzbar auch in Wiesen und Weiden.**

## Besondere Eigenschaften von Duplosan® KV Combi

Die Wirkstoffe MCPP-P und 2,4 D werden über die Blätter der Unkräuter aufgenommen und bis in die Wurzeln transportiert. In den Pflanzen verursachen Wuchsstoffe ungeordnete Zellteilungen, die zum Absterben der Unkräuter führen. Vollständige Unkrautvernichtung tritt erst nach etwa 4–6 Wochen auf. Die Wirkung wird von wüchsiger Witterung gefördert. Die Temperatur soll im Anwendungszeitpunkt und an nachfolgenden Tagen über 12 °C liegen.

### Anwendung

**Getreide:** 2.5-3.25 l/ha, gegen zweikeimblättrige Unkräuter, inkl. Klebern

**Wiesen und Weiden:** 2.5-3.25 l/ha, gegen *Einjährige Disteln*, *Weisser Germer*. Teilwirkung: *Rumex*-Arten. Anwendung: Flächenbehandlung, vor Neuansaat. 0.5-1 %, gegen *Einjährige Disteln*, *Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.)*, *Weisser Germer*. Teilwirkung: *Rumex*-Arten. Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Rückenspritze. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen.

10 %, gegen *Einjährige Disteln*, *Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.)*, *Weisser Germer*. Teilwirkung: *Rumex*-Arten. Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Handspritzgeräten. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen.

**Kern- und Steinobst:** 2.5-3.25 l/ha, gegen zweikeimblättrige Unkräuter.

**Zier- und Sportrasen:** 4 l/ha, gegen zweikeimblättrige Unkräuter, inkl. Weissklee. Teilwirkung: *Einjährige und Mehrjährige Ehrenpreis*-Arten, *Gundelrebe*, *Kriechender Günsel*.

**Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV):** 0.5-1 %, gegen *Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.)*. Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Rückenspritze. Gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, Anhang 2.5): Nur Einzelpflanzenbehandlung anderweitig nicht bekämpfbarer Problempflanzen auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen.

10 %, gegen *Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.)*. Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Handspritzgeräten. Gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, Anhang 2.5): Nur Einzelpflanzenbehandlung anderweitig nicht bekämpfbarer Problempflanzen auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen.

### Produktprofil von Duplosan® KV Combi

Formulierung und Wirkstoffe: Duplosan® KV Combi ist als wasserlösliches Konzentrat formuliert und enthält  
14% 160 g/l **2.4-D**  
30.7% 350 g/l **Mecoprop-P**.

Einstufung:



Packungsgrösse:

10 l

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.

® Reg. Warenzeichen Nufarm GmbH, A