

Duplosan[®] KV Combi **Herbizid**

Selektives Herbizid mit grosser Wirkungsbreite für den Feldbau, Obstbau und Rasen. Erfasst mit geringer Aufwandmenge alle wichtigen ein- und mehrjährigen wuchsstoffempfindlichen Unkräuter.

Produkt	Enthält als Wirkstoffe 30.7% (350 g/l) Mecoprop-P und 14% (159.6 g/l) 2,4-D. Formulierung: wasserlösliches Konzentrat
Anwendungsbereich	Obstbau, Feldbau, Zierpflanzenbau und Nichtkulturland
Wirkungsspektrum	Erfasst werden Ackersenf, Amarant, Ausfallraps, Blacken, Disteln, Ehrenpreis, Franzosenkraut, Hahnenfuss, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Klebern (bis 4-Blatt), Knöterich, Löwenzahn, Melden, Mohn, Vogelmiere, Winden. Eine Teilwirkung besteht gegen Hohlzahn, Kamille, Taubnessel
Anwendung Feldbau	Getreide: 2.5-3.25 lt/ha, gegen <i>zweikeimblättrige Unkräuter, inkl. Klebern</i> Wiesen und Weiden: 2.5-3.25 lt/ha, gegen <i>Einjährige Disteln, Weisses Germer</i> . Teilwirkung: <i>Rumex-Arten</i> . Anwendung: Flächenbehandlung, vor Neuansaat. 0.5-1 %, gegen <i>Einjährige Disteln, Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.), Weisses Germer</i> . Teilwirkung: <i>Rumex-Arten</i> . Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Rückenspritze. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen. 10%, gegen <i>Einjährige Disteln, Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.), Weisses Germer</i> . Teilwirkung: <i>Rumex-Arten</i> . Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Handspritzgeräten. Beweidung oder Schnitt (Grünfutter oder Konservierung) frühestens 3 Wochen nach der Behandlung. Ausnahme: Für nicht laktierende Tiere beträgt die Wartefrist 2 Wochen.
Obstbau	Kern- und Steinobst: 2.5-3.25 lt/ha, gegen <i>zweikeimblättrige Unkräuter</i> .
Zierpflanzenbau	Zier- und Sportrasen: 4 lt/ha, gegen <i>zweikeimblättrige Unkräuter, inkl. Weissklee</i> . Teilwirkung: <i>Einjährige und Mehrjährige Ehrenpreis-Arten, Gundelrebe, Kriechender Günsel</i> .

Technisches Merkblatt

Nichtkulturland	Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen (gem. ChemRRV): 05-1 %, gegen <i>Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.)</i> Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Rückenspritze. Gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, Anhang 2.5): Nur Einzelpflanzenbehandlung anderweitig nicht bekämpfbarer Problempflanzen auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen. 10 %, gegen <i>Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.)</i> . Anwendung: Einzelpflanzenbehandlung mit Handspritzgeräten. Gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, Anhang 2.5): Nur Einzelpflanzenbehandlung anderweitig nicht bekämpfbarer Problempflanzen auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen.
Wirkungsweise	Die Wirkstoffe von Duplosan KV Combi werden über das Blatt der Unkräuter aufgenommen und in der ganzen Pflanze verteilt. Sie verursachen ein übersteigertes Wachstum welches schliesslich zum Absterben der betroffenen Pflanzen führt. Getreide und andere Gräser werden aufgrund hoher Selektivität im Wachstum nicht beeinflusst.
Nachbau	Nach einer normalen Getreidekultur können alle Kulturen angebaut werden.
Einstufung	N, Xn; R 22-41-43-51/53; S 02-24-26-35-37/39-46-57; SP 1
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	10 lt.
®	Reg. Warenzeichen Nufarm GmbH AUS
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 25/11/15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch