

EfficanTM

Herbizid

Nachauflaufferbizid für Kartoffeln, Mais, Erbsen, Soja, Kunstwiesen und Getreide mit Einsaaten.

| | |
|----------------------------|---|
| Produkt | Effican ist ein (SL) Wasserlösliches Konzentrat und enthält 480 g/l Bentazon |
| Anwendungsbereich | Baldrian, Johanniskraut, Melisse, Minze, Wolliger Fingerhut, Eiweisserbse, Konservenerbse, Sojabohnen, Getreide, Kartoffeln, Kleegrasmischungen, Luzerne, Lein, Mais, Trockenreis. |
| Wirkungsspektrum | <p>Gute Wirkung gegen: Ackersenf, Amarant, Ausfall-Raps, Ausfall-Sonnenblumen, Bingelkraut, Commelina, Erdrauch, Floh-Knöterich, Franzosenkraut, Klatschmohn, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn (Gluren), Hundspetersilie, Kamillen, Klebern (Klettenlabkraut), Kreuzkraut, Kornblume, Melde, Vergissmeinnicht, Vogelmiere (Hühnerdarm), Winden-Knöterich, Zyperngras (Cyperus spp.).</p> <p>Teilwirkung gegen: Ehrenpreis, einjährige Gänsedistel, Vogel-Knöterich, Hahnenfuss, Nachtschatten, Taubnessel.</p> |
| Anwendung Gemüsebau | <p>Gemüsebohnen mit Hülsen: 2-3 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter Anwendung: Nachauflauf. Splitbehandlung mit niedriger Aufwandmenge ist zu bevorzugen (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge).</p> <p>Melisse, Minze Johanniskraut, Baldrian: 2 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter (max. 1 Anwendung pro Kultur und Jahr, Im Frühjahr nach dem Austrieb, bei einer 5 - 15 cm Wuchshöhe. Auch als Splitbehandlung 2 x 1 lt/ha im Abstand von 8 bis 14 Tagen).</p> <p>Wolliger Fingerhut: 2 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter (im Ansaatjahr, max. 1 Anwendung pro Kultur und Jahr, Nach dem Auflaufen).</p> |
| Feldbau | <p>Eiweisserbse, Erbse ohne Hülsen (Konservenerbse), Sojabohne: 2-4 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter. Splitbehandlung mit niedriger Aufwandmenge ist zu bevorzugen (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge).</p> |

Technisches Merkblatt

| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>Getreide: 4 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter (Insbesondere gegen Kamillen, Klebern und Vogelmieren).</p> <p>Kartoffeln: 2 lt/ha gegen Klettenlabkraut (Früher Nachauflauf, Bei Kartoffeln, insbesondere Saatkartoffeln, können vorübergehende Blattverfärbungen auftreten).</p> <p>Kleegrasmischungen, Luzerne: 2-3 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter. Wartefrist 3 Wochen, Splitbehandlung mit niedriger Aufwandmenge ist zu bevorzugen (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge), Bei Verfütterung an Rinder oder Galttiere 2 Wochen Wartefrist.)</p> <p>Mais: 2 lt/ha gegen Zweikeimblättrige Unkräuter (Unkräuter: 2-4-6-Blattstadium (Maishöhe: 10-20 cm).</p> <p>Trockenreis: 2 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter, inkl. Commelina und Zyperngras.</p> <p>Lein: 2 lt/ha gegen einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter.</p> |
| Wirkungsweise | <p>Effican ist ein Nachauflaufherbizid mit Kontaktwirkung gegen breitblättrige Unkräuter. Der Wirkstoff hemmt die Photosynthese, indem er den Elektronentransport in den Pflanzenzellen unterbricht und dadurch die CO₂-Assimilation stört. Die beste Wirkung wird erreicht, wenn die Unkräuter bei der Behandlung im Keim- bis max. 4 -Blatt-Stadium sind. Split-Anwendungen bringen meistens eine bessere Wirkung als eine einzelne Behandlung. Wüchsige Witterung, hohe Luftfeuchtigkeit und Licht begünstigen die Wirkung.</p> |
| Herstellung Spritzbrühe | <p>Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.</p> <p>Mischbarkeit: Effican ist mischbar mit unseren Herbiziden.</p> |
| Nachbau | <p>Nach einer normalen Kulturzeit bestehen keine Einschränkungen in der Fruchtfolge. Bei vorzeitigem Umbruch (Pflügen) sind folgende Kulturen möglich: Getreide, Kartoffeln, Mais, Erbsen, Ackerbohnen, Buschbohnen, Soja, Sonnenblumen, Klee und Luzerne. Nicht möglich ist der Nachbau von Zuckerrüben oder Karotten.</p> |
| Einstufung | <p>Achtung; GHS 07; H317, H319, H412; EUH401; SP 1</p> |
| Umweltverhalten | <p>Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen</p> |

Technisches Merkblatt

| | |
|----------------------|--|
| | Labelprogramme sind zu beachten. Produkt ist kein Bienengift. |
| Verpackung | 1 lt. 5 lt. |
| ® | |
| Zur Beachtung | Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen. |

Version 03.11.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch