

Final K[®]

Engrais UE

Produit liquide concentré à base de potassium soluble dans l'eau à 100%

Produit	Final K contient 462 g/l de potassium (K ₂ O) et 45 g/l d'azote total (N) sous forme d'azote uréique
Cultures	Arboriculture (O), Culture des baies (B), Culture maraîchère (G), Viticulture (W), Grand culture (F).
Spectre d'efficacité	Final K corrige et prévient les carences en potasse.
Emploi	
Culture des baies	Fraise: 4-5 x 2 lt/ha, Application: Première application avant la floraison, applications suivantes durant la croissance des baies.
Arboriculture	Pommier: 4 x 2,5 lt/ha, Application: Pour des arbres normalement fournis Pommier: 4 x 3 lt/ha, Application: Pour des arbres fortement fournis, jusqu'à 3-4 semaines avant la récolte. Abricotier, Pêcher/Nectarine, Prunier (Pruneau/Prune): 4 x 2,5 lt/ha, Application: Pour des arbres normalement fournis Abricotier, Pêcher/Nectarine, Prunier (Pruneau/Prune): 4 x 3 lt/ha, Application: Pour des arbres fortement fournis, jusqu'à 3-4 semaines avant la récolte. Cerisier: 4 x 3 lt/ha, Application: de stade 75 BBCH (début de la formation des fruits) Cerisier: 4-5 lt/ha, Application: Après la récolte jusqu'au commencement de la chute des feuilles.
Viticulture	Vigne: 3 x 2-3 lt/ha, Application: de stade 75-85 BBCH (de la fermeture de la grappe à la mi véraison)
Grande culture	Céréales: 3-4 lt/ha, Application: de stade 31 BBCH (stade 1er noeud) Colza: 3-4 lt/ha, Application: en automne. Pour augmenter la résistance

Culture maraîchère	Colza: 3-5 lt/ha, Application: de stade 55 BBCH (pleine floraison de la tige principale, jusqu'au début de la formation des siliques). Pommes de terre: 4x5 lt/ha, Application: de stade 37 BBCH (début de la fermeture des rangs) pour renforcer les plantes contre les aléas climatiques. Maïs: 5-10 lt/ha, Application: de stade 14-16 BBCH (stade 4-6 feuilles) pour renforcer les plantes contre les aléas climatiques. Betterave à sucre: 5-10 lt/ha, Application: de stade 18-33 BBCH (stade 8 feuilles à début de la fermeture des lignes) pour renforcer les plantes contre les aléas climatiques. Betterave à salade: 5-10 lt/ha, Application: de stade 19 BBCH (Behandlung vor dem Schliessen der Reihe beenden). Choux, Chou-fleur: 3 x 4-5 lt/ha, Application: de stade 16 BBCH bis Kopfbildung. Tomate, Poivron, Aubergine: 1 x 2 lt/ha, Application: Avant les premières fleurs. Tomate, Poivron, Aubergine: 3-5 x 2 lt/ha, Application: Régulièrement pendant la croissance des fruits. Concombre, Cucurbitacées: 1 x 2 lt/ha, Application: Avant les premières fleurs. Concombre, Cucurbitacées: 3-5 x 2 lt/ha, Application: Régulièrement pendant la croissance des fruits. Carotte, Céleri: 5 x 3 lt/ha, Application: de stade 19 BBCH. Régulièrement pendant la croissance. Melons: 2 x 3 lt/ha, Application: de stade 16 BBCH. Régulièrement pendant la croissance des fruits. Épinard: 3 x 2-3 lt/ha, Application: de stade 19 BBCH. Tous les 10 jours. Épinard: 4-5 x 2-3 lt/ha, Application: Pendant la phase de croissance, jusqu'à 15 jours avant la récolte. Poireau: 5 x 3-5 lt/ha, Application: pendant toute la période de grossissement. Augmenter le nombre de passage en production automnale et hivernale si le lessivage est important.
----------------------------------	--

Mode d'action	Grâce à sa formulation spéciale qui permet d'éviter les antagonismes avec les ions Ca^{++} et Mg^{++} présents dans les eaux dures et qui diminuent fortement l'efficacité des engrais potassiques Final K assure: • Une meilleure récolte et de qualité supérieure dans les fruits, la vigne et les pommes de terre. • Plus de goût et une meilleure coloration pour les fruits et le raisin. • Des fruits plus gros, plus uniformes et plus fermes. • Une durée de vie et de stockage allongée. • Améliore la résistance au stress lors des phases de sécheresse. • Améliore la résistance aux maladies. Final K® peut être utilisé de manière sur car il ne contient ni chlore, soufre et azote sous forme ammoniacal ou nitrique.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Mélanges: Final K est miscible avec nos fongicides.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Non toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les eaux. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	20 lt.
®	Marque déposée par Trade Corporation International S.A.U.
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 16.02.19/RH/LG1223