

Final K[®]

Concime

Prodotto liquido concentrato a base di potassio solubile in acqua al 100%.

Prodotto	Final K contiene 462 g/l di potassio (K ₂ O) e 45 g/l di azoto totale (N) sottoforma di azoto ureico.
Colture	Frutticoltura, coltura di bacche, orticoltura, viticoltura, campicoltura.
Spettro d'efficacità	Final K corregge e previene le carenze di potassio.
Impiego	
Colture a bacche	Fragola: 4-5 x 2 lt/ha, Applicazione: primo trattamento avanti la fioritura, applicazioni seguenti : durante la crescita delle bacche.
Frutticoltura	Melo: 4 x 2,5 lt/ha : per gli alberi normalmente carichi di frutti. Melo: 4 x 3 lt/ha, Applicazione: per gli alberi fortemente carichi di frutti. Trattare fino a 3-4 settimane prima del raccolto. Albicocco, Pesco/pesco noce, Prugno 4 x 2,5 lt/ha per alberi normalmente carichi in frutti. 4 x 3 lt/ha per alberi fortemente carichi in frutti. Trattare fino a 3-4 settimane prima del raccolto. Ciliegio 4 x 3 lt/ha : Applicare dallo stadio 75 BBCH (inizio formazione dei frutti). 4-5 lt/ha : Applicare da dopo il raccolto fino all'inizio della caduta delle foglie.
Viticultura	3 x 2-3 lt/ha : Applicare dallo stadio 75-85 BBCH (dalla chiusura del grappolo fino a metà invaiatura).
Campicoltura	Cereali: 3-4 lt/ha : Applicare dallo stadio 31 BBCH (stadio 1 nodo) Colza 3-4 lt/ha : Applicare in autunno. Serve ad aumentare la resistenza. 3-5 lt/ha : Applicare dallo stadio 55 BBCH (piena fioritura dello stelo principale fino all'inizio della formazione della siliqua).

Orticoltura	Patate: 4x5 lt/ha: Applicare dallo stadio 37 BBCH (inizio chiusura delle file) per rinforzare le piante contro le perturbazioni climatiche. Granoturco: 5-10 lt/ha : Applicare dallo stadio 14-16 BBCH (stadio 4-6 foglie) per rinforzare le piante contro le perturbazioni climatiche. Barbabietola da zucchero: 5-10 lt/ha Applicare dallo stadio 18-33 BBCH (stadio 8 foglie a inizio chiusura delle file) per rinforzare le piante contro le perturbazioni climatiche. Barbabietole : 5-10 l/ha Applicare dallo stadio 19 BBCH (finire i trattamenti prima della chiusura delle file). Specie di cavoli, cavolfiore 3 x 4-5 lt/ha, Applicare dallo stadio 16 BBCH fino all'inizio della formazione dell'inflorescenza a corimbo. Pomodori, Peperoni, Melanzane 1 x 2 lt/ha prima della formazione dei primi fiori. 3-5 x 2 lt/ha Applicare regolarmente durante la crescita dei frutti. Cetrioli, Cucurbitacee 1 x 2 lt/ha Applicare prima della formazione dei primi fiori. 3-5 x 2 lt/ha Applicare regolarmente durante la crescita dei frutti. Carote, Sedano 5 x 3 lt/ha : Applicare regolarmente dallo stadio 19 BBCH fino alla raccolta. Meloni: 2 x 3 lt/ha, Applicare regolarmente dallo stadio 16 BBCH fino alla raccolta. Spinaci 3 x 2-3 lt/ha, Applicare dallo stadio 19 BBCH ogni 10 giorni. 4-5 x 2-3 lt/ha, Applicare durante la fase di crescita fino a 15 giorni prima del raccolto. Porro: 5 x 3-5 lt/ha, Applicare durante tutto il periodo di crescita. Aumentare i trattamenti in produzione autunnale e invernale, se il dilavamento è importante.
Modo di azione	Grazie alla sua formulazione speciale, la quale permette d'evitare gli antagonismi con gli ioni Ca^{++} e Mg^{++} presenti nelle acque dure, i quali diminuiscono fortemente l'efficacia dei concimi potassici, Final K assicura:

	• Una migliore raccolta e una qualità superiore in arboricoltura, nella vigna e nella coltura di patate. • Più gusto e una migliore colorazione per la frutta e per l'uva. • Dei frutti più grossi, più uniformi e più sodi. • Una durata di vita e uno stoccaggio più lungo. • Migliora la resistenza allo stress durante le fasi di siccità. • Migliora la resistenza alle malattie. Final K® può essere utilizzato con sicurezza, perchè non contiene né cloro né zolfo o azoto in forma ammoniacale o nitrica.
Preparazione della poltiglia	Versare il prodotto direttamente nel serbatoio riempito a metà con acqua. In seguito completare la botte secondo il bisogno. Agitare costantemente la poltiglia. Mescolabilità: Final K é mescolabile con i nostri fungicidi.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio..
Comportamento nell'ambiente	Non è tossico per le api e per i pesci. Evitare il contatto del prodotto con l'acqua. Si può utilizzare in PER. Le restrizioni per certi programmi sono da osservare.
Imballaggio	1 lt, 5 lt.
®	Marca depositata da Trade Corporation International S.A.U.
Osservazioni	Questo foglio vi informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e attenersi conformemente alla stessa.

Version 16.02.19/RH/RF/LG1223