

Frontier[®] X2

Dimethenamid-P



- **Bodenherbizid**
- **Breitwirksam gegen zweikeimblättrige Unkräuter und alle Hirse-Arten**
- **feuchtes und feinkrümeliges Saatbeet unterstützt die Wirkung**



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

 **Leu+Gygax AG**

Wirkungsspektrum

Sehr gute bis gute Wirkung:

Borstenhirsen, Fingerhirsen, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Panicum-Hirsen, Amaranth, Franzosenkraut, Gänsefuss-Arten, Hirtentäschel, Kamille, Mohn, Schwarzer Nachtschatten, Taubnessel, Vogelmiere. Nicht erfasst werden mehrjährige Unkräuter.



Produkteprofil

Formulierung: EC - Emulsionskonzentrat

Wirkstoff: Dimethenamid-P 64% (720 g/l)

GHS-Einstufung:

Achtung



GHS 07



GHS 09

Wirkungsweise

Der Wirkstoff Dimethenamid-P wird vorwiegend über den Spross der keimenden Unkräuter aufgenommen. Dimethenamid-P wirkt nur auf keimende Unkräuter, bereits aufgelaufene Pflanzen im fortgeschrittenen Stadium werden nicht oder nur ungenügend erfasst.

Anwendung

Bohnen mit Hülsen:	1.2 - 1.4 l/ha, gegen <i>einjährige Unkräuter und einjährige Ungräser</i> . Anwendung: Vorauflauf.
Ackerbohne:	1.2-1.4 lt/ha, gegen <i>einjährige Unkräuter und einjährige Ungräser</i> . Anwendung: Vorauflauf.
Futter und Zuckerrüben:	1.4 lt/ha, gegen <i>einjährige Unkräuter und einjährige Ungräser</i> . Splitbehandlung (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge pro Parzelle und Jahr): Keimblatt- bis 2-Blattstadium: 0.2-0.3 l/ha; 4- bis 6-Blattstadium: 0.5-0.9 l/ha.
Mais:	1.2-1.4 lt/ha, gegen <i>einjährige Unkräuter und einjährige Ungräser</i> . Anwendung: Frühjahr; Vorauflauf und früher Nachauflauf, bis 3-Blatt-Stadium (BBCH 00-13).
Sojabohne, Sonnenblume:	1.2-1.4 lt/ha, gegen <i>einjährige Unkräuter und einjährige Ungräser</i> . Anwendung: Vorauflauf.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.

Mischbarkeit

Frontier® X2 nicht mit Herbizidöl oder Blattdüngern mischen.