

# Goltix<sup>®</sup> 700 SC

## Das Basisherbizid für den Rübenbau



- **Effiziente Wirkung durch neue Formulierung**
- **Hervorragende Verträglichkeit**
- **Flexibler Einsatz im Vor- und Nachauflauf möglich**



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)

 **Leu+Gygax AG**

## Besondere Eigenschaften von Goltix® 700 SC

Goltix® 700 SC ist eine weiterentwickelte anwenderfreundliche SC-Formulierung. Die extrem feine Vermahlung des Wirkstoffes Metamitron (micro-mill-technologie) in der Goltix® 700 SC Formulierung ist ein entscheidendes Qualitätskriterium und trägt wesentlich für eine optimale Verteilung und Aufnahme des Wirkstoffes bei. Durch die neue innovative Formulierung von Goltix® 700 SC ist es gelungen, den Anteil der Blattwirkung nochmals zu steigern. Dies führt im Vergleich zu herkömmlichen Flüssigformulierungen zu einer noch besseren Absorption des Wirkstoffes, bei jedoch gleichbleibend guter Rübenverträglichkeit. Die speziell entwickelte und patentierte Rezeptur für Goltix® 700 SC enthält zudem besonders reine, langkettige, ungesättigte Fettsäuren, die zur Verbesserung der UV-Stabilität des Wirkstoffes beitragen.



## Produktprofil

Formulierung: SC - Suspensionskonzentrat

Wirkstoff: Metamitron 700 g/l

GHS-Einstufung:

Achtung



GHS 07



GHS 09

Packungsgrösse: 5 l

## Wirkungsspektrum

**gut zu bekämpfen:** Ackerhellerkraut, Ackerleinkraut, Amarant, Einjähriges Rispengras, Flohknöterich (Pfirsichblättriger Knöterich), Gemeine Melde, Weisser Gänsefuss, Gemeiner Holzzahn, Hellerkraut, Hirtentäschelkraut, Hundspetersilie, Kamille-Arten, Kleinblättriges Franzosenkraut, Kleine Brennessel, Kornblume, Persischer Ehrenpreis, Rainkohl, Saatwucherblume, Schwarzer Nachtschatten, Stiefmütterchen, Taubnessel-Arten, Vogelmiere.

## Mischbarkeit

Goltix® 700 SC ist mit unseren Herbiziden mischbar.

**Eine Zumischung von Spark** (z.B. gegen Gänsefuss) **ist möglich.**

**Spezieller Hinweis:** Nicht mit Insektiziden und Blattdüngern mischen.

## Anwendung

**Gemüsebau:** 1 - 5 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)*, *Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Vor- und Nachauflauf. Splitbehandlung möglich (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge). Behandlung im Abstand von 6-14 Tagen.

**Futter- und Zuckerrüben:** 3-5 lt/ha, gegen *Einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und einjährige einkeimblättrige Ungräser*. Anwendung: Vor- und Nachauflauf. Splitbehandlung möglich (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge).

® reg. Markenzeichen der; ADAMA, IL



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.