

Goltix[®] 700 SC

Herbicide de base pour les betteraves



- **efficacité améliorée par une formulation liquide**
- **excellente sélectivité**
- **emploi souple, en pré- ou post-émergence possible**



5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

 **Leu+Gygax SA**

Mode d'action

Metamitron agit par le sol et par les feuilles des mauvaises herbes sur la photosynthèse des plantes.

Spectre d'activité

bonne efficacité: Tabouret des champs, Linaira des champs, Amarantes, Pâturin annuel, Renouée persicaire (*Polygonum persicaria*), Chénopodes, Ortie royale, Bourse à pasteur, persil, Camomille, Galinsoga à petites fleurs, Ortie brûlante, Bleuet, véronique de Perse, Lampsane commune, marguerite dorée, morelle noire, pensées, espèce d'ortie, mouron.



Profil du produit

Formulation: SC - Suspension concentrée

Matière active: Metamitron 700 g/l

Spécification::

Attention



GHS 07



GHS 09

Emballage: 5 l

Miscibilité

Goltix® 700 SC est miscible avec nos herbicides.

Un mélange avec Spark (p. ex. contre chénopodes) **est également possible.**

Remarque spéciale: ne pas mélanger avec des insecticides et des engrais foliaires.

Application

Cultures maraîchères: 1 - 5 lt/ha, contre les dicotylédones annuelles et les monocotylédones annuelles. Application: Pré- et post-levée. Traitement splité possible (la quantité d'application indiquée correspond à la quantité totale autorisée). Traitement à intervalles de 6-14 jours.

Betteraves fourragères et sucrières: 3-5 lt/ha, contre *contre dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: Pré- et post-levée. Traitement splité possible (la quantité d'application indiquée correspond à la quantité totale autorisée).

® Marque déposée par; ADAMA, IL



Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.