

Granat

Herbicide

Herbicide résiduaire systémique pour l'arboriculture, les cultures maraîchères et les plantes ornementales.

Produit	Granat est une suspension concentrée et contient 400 g/l Propyzamide.
Cultures	Cassis, Groseilles à grappes, Groseilles à maquereau, Fruits à noyaux, Fruits à pépins, Chicorée witloof (chicorée-endive), Salades (Asteraceae), Colza, Arbres et arbustes (hors forêt).
Spectre d'efficacité	Granat est très efficace contre chiendent, jouet-du-vent, vulpin, folle avoine, repousses de céréales, bromes, espèces de millets, ray-grass, pâturins, Sorghum halepense, bleuet, chénopode, espèces de renouées, coquelicot, renoncule, plantain, rumex (par semis), morelle noire, mouroin des oiseaux. Pas d'efficacité contre le gaillet grateron, les ombellifères, le galinsoga, la matricaire et le séneçon.
Emploi Culture des baies	Cassis, Groseilles à grappes, Groseilles à maquereau (Plein air): 5-6.25 lt/ha, contre <i>chiendent rampant</i> . Application: de fin octobre à mi-Janvier. Traitement 6 mois au plus tôt après la plantation. Sur sol sans neige et non gelé. 2.5 - 4 l/ha, contre <i>dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles</i> . Application: de fin octobre à mi-Janvier. Traitement 6 mois au plus tôt après la plantation. Sur sol sans neige et non gelé.
Arboriculture	Fruits à noyaux, Fruits à pépins: 5-6.25 lt/ha, contre <i>chiendent rampant</i> . Application: traitement d'hiver (pendant le repos de la végétation). Sur sol sans neige et non gelé. 2.5 - 4 l/ha, contre <i>dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles</i> . Application: traitement d'hiver (pendant le repos de la végétation). Sur sol sans neige et non gelé.
Cultures maraîchères	Chicorée witloof (chicorée-endive) [production de racines]: 2.8-3.1 lt/ha, contre <i>dicotylédones annuelles, monocotylédones annuelles</i> . Application: Pré-levée à post-levée (jusqu'au stade 8 feuilles de la culture au plus tard). Après le semis ou la plantation.

Grande culture Cultures ornementales	Il est possible de fractionner le traitement (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). Par faibles précipitations et dans les régions sèches, procéder à un arrosage après le traitement. Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use). Salades (Asteraceae) (Plein air): 2.5 - 3.75 lt/ha, contre <i>dicotylédones annuelles</i>, <i>monocotylédones annuelles</i>. Application: après le semis ou la plantation. Par faibles précipitations et dans les régions sèches, procéder à un arrosage après le traitement. Colza: 1.25-1.875lt/ha, contre <i>dicotylédones annuelles</i>, <i>monocotylédones annuelles</i>. Application: post-levée en automne: Stade 14-16 (BBCH). Ne pas cultiver des céréales après un retournement de colza dû à un mauvais hivernage. En revanche, les cultures de pommes de terre, de betteraves, de pois, de haricots, de colza de printemps et de maïs conviennent comme cultures suivantes. Arbres et arbustes (hors forêt): 5-6.25 lt/ha, contre <i>chiendent rampant</i>. Application: de fin octobre à mi-Janvier. 2.5-4 lt/ha, contre <i>dicotylédones annuelles</i> <i>monocotylédones annuelles</i>. Application: de fin octobre à mi-Janvier. Traitement 6 mois au plus tôt après la plantation. Sur sol sans neige et non gelé.
Mode d'action	La matière active du Granat est principalement absorbée par les racines. Dans la plante, la matière active est transportée par la voie apoplastique. Elle empêche l'assemblage des microtubuli dans les plantes sensibles. L'effet de l'herbicide se manifeste lentement. De préférence traiter pendant la saison froide. Etant un herbicide résiduaire, Granat a besoin d'assez d'humidité pour être efficace.
Préparation de la bouillie	Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Mélanges: Granat est miscible Reglone.
Classement	Attention  Tenir hors de portée des enfants. EUH 208 Contient [1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one]. Peut produire une réaction allergique.

	EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 lt.
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 09.02.18/RH/LG0000



5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch