

# Kofa-TMR

**für die kurzfristige Stabilisierung  
von Silagefutter**



1-3 l/t Silage, kann mit Wasser verdünnt werden (siehe Rückseite)

- **im Silo, im Futtermischer, in der Tenne, auf dem Futtertisch**
- **im Kanister zu 26 Liter  
im Fass zu 215 Liter**

**Gute Silage mit Siliernitteln von**

 **Leu+Gygax AG**

5413 Birnenstorf, Telefon 056 201 45 45  
[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)

Ihr Berater: **Hans Bärlocher**

**Natel: 079 913 11 67**

## Anwendung und Dosierung

**mildes, gebrauchsfertiges  
Säuregemisch**

Zusammensetzung:  
Propionsäure, Na-Propionat,  
K-Sorbat, 1,2-Propandiol, Wasser

**Dosierung:  
1-3 l/t Silage**

höhere Dosierung bei:

- längerer Verweildauer bis zur Fütterung
- ungünstigerem Ausgangsmaterial (bereits Schimmelnester in Silage, bereits warme oder zu Erwärmung neigender Silage)
- generell trockenerer Silage
- wärmeren Umgebungstemperaturen

**Verdünnung mit Wasser - 1:1, bis 1:4 möglich  
auch pur möglich**

mit Giesskanne + Brause gleichmässig verteilen:

- über Silage im Futtermischer (auf feuchte Futterkomponenten – Heu/Emd/Stroh erst danach)
- auf Silage auf Futtertisch
- auf Silage-Anschnittfläche im/auf Silo

**Kofa-TMR stabilisiert die  
Silage/Futtermischung für 1-2 Tage**

wirkt der Futtererwärmung entgegen

- gutes, schmackhaftes Futter aus dem Mischwagen, auch am zweiten Tag der Mischung.

