

Micro Bor

Engrais liquide

**Engrais liquide formulé pour pulvérisation foliaire.
 Traitement préventif et curatif de la carence en bore.
 Micro-Bor contient un complexe soluble de bore et des
 composants organiques en combinaison avec des
 adjuvants pour assurer une bonne adhésion (résistance à
 la pluie) et faciliter l'absorption (pénétration) foliaire.**

Produit	Micro Bor contient 15% de bore, sous forme de complexe.
Cultures	Arboriculture (O), Cultures maraîchères (G), Viticulture (W), Grandes Cultures (F).
Spectre d'efficacité	Possède des caractéristiques physiques qui favorisent les propriétés végétatives des plantes.
Emploi	
Arboriculture	Arboriculture: 2 lt/1000 lt Eau/ha (*). Application: 2 Traitements. Avant floraison et après la chute des pétales. Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides.
Viticulture	Viticulture: 1 lt/ dans au moins 200 lt Eau/ha (*). Application: 2 Traitements. Boutons floraux séparés et nouaison. Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides.
Grandes Cultures	Betterave à sucre, Betterave fourragère, pommes de terre, Maïs: 3 lt/ dans au moins 200 lt Eau/ha (*). Application: BBCH 12-16. Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides. Colza: 3 lt/ dans au moins 200 lt Eau/ha (*). Application: la reprise de la végétation au printemps jusqu'au stade hauteur de tige 20 cm. Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides. Tournesol: 3 lt/ dans au moins 200 lt Eau/ha (*). Application: BBCH 14-18. Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides. Légumineuses: 2 lt/ dans au moins 200 lt Eau/ha (*). Application: BBCH 16. (6 vraies feuilles (10-15 cm). Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides.

Cultures maraîchères	betterave à salade: 3 lt/ dans au moins 200 lt Eau/ha (*). Application: BBCH 12-16. Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides. Autres Cultures: 3 lt/ dans au moins 200 lt Eau/ha (*). Application: Appliquer aussitôt que la surface foliaire est assez développée. Peut-être ajouté aux fongicides et aux insecticides. (*) Lignes directrices: Les dosages peuvent varier selon les résultats d'analyses du sol ou des feuilles.
Mode d'action	Micro Bor est un engrais liquide pour une utilisation préventive et curative de la carence en bore dans l'arboriculture, viticulture, petits fruits, cultures maraîchères et grandes cultures.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Mélanges: Micro Bor est seulement miscible avec les fongicides et insecticides recommandés. Ne pas mélanger avec les concentrés d'émulsion (EC) ! Les mélanges doivent être utilisés immédiatement après leur préparation. Micro Bor est ajouté en dernier dans le pulvérisateur avec l'agitateur en marche. Protection des utilisateurs:
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Danger  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H 360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 lt.
®	

A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.
-------------------	--

Version 09.02.26/RH/DE/LG0000



4665 Oftringen AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch