


Nimrod®

Fungicida

Fungicida sistemico dotato di proprietà protettive e curative contro l'oidio nelle rose, piante ornamentali, frutticoltura e colture di bacche.

Prodotto	Nimrod® è un concentrato emulsionato (EC) e contiene 26.9 % (250 g/l) Bupirimate. (W-6845)
Colture	Coltivazione di bacche, coltivazione piante ornamentali e frutticoltura.
Spettro di efficacia	Oidio della fragola, oidio delle varietà di ribes, oidio della mela/pera, oidio (diverse specie) su piante ornamentali.
Applicazione Coltivazione di bacche	<p>Fragola: 0.1% (1 lt/ha), contro <i>Oidio della fragola</i>. Termine d'attesa: una settimana. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.</p> <p>Uva spina: 0.1% (1 lt/ha), contro <i>Oidio delle varietà di ribes</i>. Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 5 trattamenti a intervalli di 2 settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.</p>
Frutticoltura	<p>Melo: 0.05% (0.8 lt/ha), contro <i>Oidio della mela/pera</i>. Termine d'attesa: 3 settimane. A determinate condizioni può causare una colorazione violacea delle foglie della varietà Idared e la caduta delle foglie di diverse altre varietà. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.</p>

<p>Coltivazione piante ornamentali</p>	<p>Alberi e arbusti (al di fuori della foresta): 0.1%, contro <i>Oidio (diverse specie) su piante ornamentali</i>. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.</p> <p>Colture da fiore e piante verdi, Rose: 0.1%, contro <i>Oidio (diverse specie) su piante ornamentali</i>. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.</p>
<p>Modalità di azione</p>	<p>Fungicida sistemico con effetto protettivo e curativo. La materia attiva Bupirimate è assorbita dalle foglie in maniera translaminare e trasportata nello xilema. Contro l'oidio, il bupirimate agisce sull'enzima adenosina deaminasi e previene la sporulazione del fungo. Alcune varietà possono essere sensibili al Nimrod®.</p>
<p>Preparazione della poltiglia</p>	<p>Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.</p> <p>Miscibilità: Nimrod® è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.</p> <p>Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture</p>

	trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	<p>Attenzione</p>  <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H226 Liquido e vapori infiammabili. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1lt.
®	Marchio registrato Adama IL
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni segnalate.

Version 09.05.22/RH/RF/LG0000