

Novodor[®] 3 FC

Insecticide

Insecticide biologique (préparation bactérienne) pour lutter contre les larves de doryphores de la pommes de terre et aubergines.

Produit	Novodor [®] 3 FC est une suspension concentrée (SC) et contient 3% (30 g/l) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i> . (W 5925)
Cultures	Culture maraîchère, Grande culture.
Spectre d'efficacité	Larves de doryphore [L1 et L2]
Emploi Culture maraîchère	Aubergine: 0.3 - 0.5 %, contre <i>les larves de doryphore [L1 et L2]</i> . Délai d'attente: 3 Jours. Application: printemps, été. Ne pas utiliser par temps froid. Seulement contre les jeunes stades larvaires.
Grande culture	Pommes de terre: 3 - 5 lt/ha, contre <i>les larves de doryphore [L1 et L2]</i> . Délai d'attente: 3 Semaine(s). Application: printemps, été. Ne pas utiliser par temps froid. Seulement contre les jeunes stades larvaires.
Mode d'action	Novodor [®] 3 FC fonctionne en deux étapes. Dans l'estomac des larves, les cristaux sont d'abord dissous et activés par des protéinases. Dans la deuxième phase, les peptiques insecticides activés causent des dommages irréversibles aux membranes cellulaires (nécrose cellulaire) et après l'ingestion du produit, les jeunes larves cessent de se nourrir et meurent au bout de 3 à 5 jours. Les larves plus âgées ne meurent pas dans tous les cas, cependant leur activité alimentaire est tellement réduite qu'aucun autre dommage n'est subi. Sur les doryphores adultes se produira également un effet du fait que leur ponte sera fortement altérée.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Mélanges: Novodor [®] 3 FC est miscible avec nos fongicides.
Rotation des cultures	Pas de restriction.

Classement	Ne pas respirer les aérosols. Eviter le contact avec la peau. Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. P102 Tenir hors de portée des enfants. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 lt,
®	Marque déposée
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 18.03.22RH/PM/LG0000



5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch