

Novodor[®] 3 FC

Insetticida

Insetticida biologico (preparazione batterica) per lottare contro le larve della dorifora nelle patate e nelle melanzane.

Prodotto	Novodor [®] 3 FC è una sospensione concentrata (SC) e contiene 3 % (30 g/l) [Preparato di spore, 10'000 UI/mg; Ceppo NB-176] <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i> . (W 5925)
Colture	Campicoltura, Orticoltura.
Spettro di efficacia	Dorifora della patata [L1 e L2]
Campicoltura	Patate: 3-5 lt/ha, contro <i>Dorifora della patata</i> [L1 e L2]. Applicazione: primavera, estate. Termine d'attesa: 3 settimane. Soltanto contro giovani stadi larvali. Non utilizzare in caso di temperature fredde.
Orticoltura	Melanzana: 0.3-0.5 %, contro <i>Dorifora della patata</i> [L1 e L2]. Applicazione: primavera, estate. Termine d'attesa: 3 giorni. Soltanto contro giovani stadi larvali. Non utilizzare in caso di temperature fredde.
Modalità di azione	Novodor [®] 3 FC funziona in due fasi. Nello stomaco della dorifora, i cristalli sono dapprima disciolti e attivati dalle proteinasi. Nella seconda fase, le peptici insetticida attive, causano dei danni irreversibili alle membrane cellulari (necrosi cellulare) e dopo l'ingestione del prodotto, le giovani larve cessano di nutrirsi e muoiono entro 3 a 5 giorni. Le larve più adulte, non muoiono in tutti i casi, ma la loro attività alimentare è talmente ridotta, che nessun altro danno è subito dalla coltura. Sulle dorifore adulte, possiede ugualmente un effetto, la loro deposizione viene altamente alterata.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. Miscibilità: Novodor [®] 3 FC è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	<p>Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.</p> <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.</p> <p>EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p> <p>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.</p> <p>SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate. Novodor® 3 FC è incluso nell'elenco dell'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL) e può essere utilizzato nell'agricoltura biologica e nell'orticoltura.
Imballaggio	5 lt
®	Marchio registrato
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni segnalate.

Version 22.12.22/RH/RF/LG0000