



Oikos®

Insecticide

Insecticide systémique pour l'arboriculture, les grandes cultures et les cultures maraîchères.

Produit	Oikos® est un concentré émulsionnable (EC) et contient 2.36% (26 g/l) azadirachtine A. (W-7490-2)
Cultures	Arboriculture (O), Culture maraîchère (G), Grande culture (F).
Spectre d'efficacité	puceron cendré du pommier, pucerons du feuillage, mouches blanches, pucerons du feuillage, doryphore.
Emploi Arboriculture	Pommier: 0.094% (1.5 lt/ha), contre <i>puceron cendré du pommier</i> . Application: pré- ou post-floral, jusqu'à fin mai au plus tard. Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m ³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. Période d'application optimale pour le puceron cendre du pommier stade E2 (BBCH 59). Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation.
Cultures maraîchères	Salades (Asteraceae): 1.5 lt/ha, contre <i>pucerons du feuillage</i> . Délai d'attente: 1 Semaine(s). En cas d'utilisation dans une serre, celle-ci doit être aérée soigneusement avant d'y entrer à nouveau. Tomate: 0.15%, contre <i>mouches blanches, pucerons du feuillage</i> . Délai d'attente: 3 Jours. Dès l'apparition de l'attaque, 2 à 3 applications avec un intervalle de 7 à 10 jours. En cas d'utilisation dans une serre, celle-ci doit être aérée soigneusement avant d'y entrer à nouveau.
Grandes cultures (F),	Pommes de terre: 1.5 lt/ha, contre <i>doryphore</i> . Délai d'attente: 3 Semaine(s). 3 traitements au maximum par parcelle et par année. Normalement 2 applications nécessaires avec la dose indiquée.

Mode d'action	<p>Oikos[®] est absorbé par les plantes et est véhiculée dans la plante. Oikos[®] agit principalement par ingestion, mais a aussi un effet par contact. Dans les insectes, Oikos[®] empêche la synthèse de chitine. De plus, Oikos[®] a un effet répulsif et influence l'absorption de la nourriture et la fécondité des insectes. Sa meilleure efficacité, Oikos[®] la possède contre les jeunes larves dans le cycle d'évolution des insectes. Oikos[®] n'agit pas contre les adultes.</p>
Préparation de la bouillie	<p>Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie.</p> <p>Mélanges: Oikos[®] est miscible avec nos fongicides.</p> <p>Remarques particulières : Il est préférable d'utiliser une eau légèrement acide avec un pH de 5,5-6. Oikos doit être appliqué de manière protectrice, c'est-à-dire au début du cycle de développement des insectes.</p> <p>Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection. Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection (au minimum une chemise à manches longues + des pantalons) jusqu'à 48 heures après l'application du produit.</p>
Rotation des cultures	<p>Pas de restriction.</p>
Classement	<p>Attention</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.</p>
Comportement dans l'environnement	<p>Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.</p>
Emballage	<p>1 lt. 3 lt.</p>
®	<p>Marque déposée par SIPCAM OXON SPA</p>

A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.
-------------------	--

Version 14.03.24RH/PM/LG0878



5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch