


Pendi

Herbizid

Herbizid gegen Unkräuter und Ungräser für Feldbau, Gemüsebau und Zierpflanzen.

Produkt	Pendi ist als Suspensionskonzentrat formuliert und enthält 36.04% (400 g/l) Pendimethalin.
Anwendungsbereich	Blumenkulturen und Grünpflanzen, Chinaschilf, Dinkel, Eiweisserbsen, Erbsen ohne Hülsen, Gerste, Karotten, Kartoffeln, Kenaf, Knollenfenchel, Kohllarten, Korn, Lupinen, Mais, Roggen, Schwarzwurzel, Knollensellerie, Sonnenblumen, Stangensellerie, Triticale, Trockenreis, Weizen, Wiesen und Weiden, Zwiebeln.
Wirkungsspektrum	Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Bluthirse, Hühnerhirse, Rispengräser, Fingerhirsen, Melden, Gänsefuss-Arten, Hirtentäschel, Wolfsmilch, Erdrauch, Hohlzahn, Taubnesseln, Bingelkraut, Vergissmeinnicht, Mohn, Knöterich-Arten, Senf, Vogelmiere, Hellerkraut, Brennessel, Ehrenpreis; Hederich, Kamille (nur Vorauflauf), Klebern, Ackerstiefmütterchen. Nicht wirksam gegen Wurzelunkräuter.
Anwendung Gemüsebau	<p>Erbsen ohne Hülsen: 1 lt/ha, in Mischung mit 2 lt/ha Effican, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Nachauflauf.</p> <p>Karotten: 2.5 - 4 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vor der Vorauflauf.</p> <p>Knollenfenchel, Lauch (gesät), Schwarzwurzel, Zwiebeln: 2 - 4 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vorauflauf.</p> <p>Knollensellerie, Kohllarten, Lauch (gepflanzt), Stangensellerie: 4 – 5 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vor der Pflanzung.</p>
Feldbau	<p>Chinaschilf: 4 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Nachauflauf.</p> <p>Eiweiserbse: 1 lt/ha, in Mischung mit 2 lt/ha Effican, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Nachauflauf.</p>

	<p>Gerste, Korn (Dinkel), Triticale, Roggen, Weizen: 3 - 4 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Im Herbst. Getreide-Fräsbreitsaaten sind von dieser Bewilligung ausgenommen. Es dürfen nur Saaten behandelt werden, die eine gleichmässige Saattiefe aufweisen.</p> <p>Kartoffeln: 4 - 5 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vorauflauf.</p> <p>Kenaf: 4 - 5 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vorauflauf.</p> <p>Lupinen: 2.5 - 4 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vorauflauf.</p> <p>Mais: 3 - 5 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vorauflauf.</p> <p>Sonnenblume: 3 - 4 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Unmittelbar nach der Saat.</p> <p>Trockenreis: 4 - 5 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vorauflauf.</p> <p>Wiesen und Weiden: 4 lt/ha, gegen <i>Faden-Ehrenpreis</i>. Anwendung: Herbst, nach der letzten Nutzung.</p>
Zierpflanzenbau	<p>Blumenkulturen und Grünpflanzen: 2.5-4 lt/ha, gegen <i>einjährige Zweikeimblättrige Unkräuter und Einjährige Einkeimblättrige Ungräser</i>. Anwendung: Vor dem Pikieren oder dem Pflanzen oder im Frühjahr vor dem Austrieb. <i>Kulturverträglichkeit:</i> Beratung anfordern.</p>
Verträglichkeit	<p>Pendi ist in den genannten Kulturen gut verträglich. Keine Anwendung auf Sandböden. Es dürfen nur Getreide-Saaten behandelt werden, die eine gleichmässige Saattiefe von min. 3cm aufweisen. Nicht anwenden bei gesäten Zwiebeln zur Steckzwiebelproduktion. Bei Sommerflor nur bei Topf- oder Ballenpflanzen anwenden.</p> <p>Spezielle Hinweise: Obere Dosierungen jeweils in schweren, humosen Böden verwenden. In gesäten Kulturen sind bei starken Niederschlägen nach der Spritzung leichte Vergilbungen möglich.</p>
Wirkungsweise	<p>Der Wirkstoff von Pendi, Pendimethalin, wird von den Ungräsern und Unkräutern über die Blätter, die Wurzeln und die Koleoptile aufgenommen. In empfindlichen Pflanzen verhindert Pendimethalin die Zellteilung und die Zellstreckung.</p>

Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge Produkt beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.
Nachbau	Bei vorzeitigem Umbruch kann nach Pflügen Getreide, Mais, Kartoffeln, Ackerbohnen, Erbsen, Rotklee, Luzerne, Soja und Sonnenblumen angesät werden.
Einstufung	<p>Achtung</p>  <p>Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. EUH 208 Enthält (Pendimethaline, 1,2-Benzisothiazolin-3-one). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.</p>
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. Produkt ist kein Bienengift.
Verpackung	5 lt. 10 lt.
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 08/01/18/RH/LG1125