


Prox

Fungicida

Fungicida sistemico per lottare contro l'oidio in viticoltura.

Prodotto	Prox è una emulsione concentrata (EC) e contiene 50 % 500 g/l Spiroxamina.
Colture	Viticoltura
Spettro di efficacia	Oidio della vite
Applicazione Vitecoltura	<p>Vite: 0.05 % (0.8 lt/ha), contro <i>Oidio della vite</i>. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Al massimo 4 trattamenti per anno e particella. Non trattare su uva da tavola. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.</p> <p>Vite: 0.05 % (0.8 lt/ha), contro <i>Oidio della vite</i>. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Al massimo 4 trattamenti per anno e particella. Non trattare su uva da tavola. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG. Applicazione per via aerea. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 60 metri dalle acque superficiali.</p>

Modalità di azione	Spiroxamine è un inibitore della sintesi degli steroli e appartiene al gruppo delle piperidine. La materia attiva, penetra rapidamente nella pianta e si ripartisce regolarmente nelle parti verdi. Essa ha un effetto protettivo e stoppante.
Preparazione della poltiglia	<p>Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.</p> <p>Miscibilità: Prox è mescolabile secondo le indicazioni date dal consulente LG.</p> <p>Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.</p>
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	<p>Attenzione</p>  <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.</p>
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	

Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version 23.11.21/RH/RF/LG0000



5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch