

Storm[®] Secure

Rodentizid

Rodentizid der neusten Generation in anwendungsfreundlicher Blockform gegen Ratten und Mäuse.

Produkt	Storm Secure ist als gebrauchsfertiger Köderblock formuliert und enthält 0.005% Flocoumafen.
Anwendungsbereich	In Gebäuden, Tierställen, Kanalisationen und andere feuchte Standorte.
Wirkungsspektrum	Wanderratten und Hausmäuse.
Anwendung	<p>Rattenbekämpfung in Räumen, Tierställen und Freiland 2 Blöcke/Köderstelle (40g Ködermaterial) in der Nähe sichtbarer Rattenaktivität auslegen. Der Abstand zwischen den Köderstellen auf 5-10 m festzulegen. Zusätzlich werden einige Blöcke direkt in die Rattenlöcher gelegt.</p> <p>Rattenbekämpfung in Kanalisationen Zur Feststellung stark von Ratten frequentierten Gebieten werden unbegiftete Köder (Haferflocken, Sonnenblumenkerne) ausgelegt. 3 Tage nach der Anköderung werden an den Befallsstellen Giftköder ausgelegt. Die Bekämpfung von Ratten sollte im Frühjahr oder Spätherbst erfolgen um die Abschwemmung (Schmelzwasser, Starkregen) der Köder zu verhindern. Pro Köderstelle sind 5-10 (100-200g Ködermaterial) miteinander verdrahtete Blöcke auszulegen. Die Blöcke sollten zusätzlich befestigt sein um die Verschleppung durch Ratten zu verhindern. Dadurch bleibt die Köderaufnahme durch die Ratten überprüfbar.</p> <p>Mäusebekämpfung in Räumen und Tierställen 1 Block/Köderstelle (20g Ködermaterial) in Raum und Tierstall in der Nähe sichtbarer Mäuseaktivität auslegen. Der Abstand der Köderstellen sollte ungefähr 2m betragen.</p> <p>Kontrolle Je nach Befallsstärke die Köderstellen in der ersten Woche 1-2 mal kontrollieren. Bei der Kontrolle verbliebene Köderreste durch frische Formköder ersetzen. In der Folge Köderstellen alle 7 Tage kontrollieren.</p> <p>Wichtig Das Auslegen der Köder darf nicht offen erfolgen. Die Köder sind sorgfältig zu überdecken oder in Köderboxen auszulegen. Die Block müssen für Kinder und Haustiere unerreichbar sein. Beim Auslegen der Storm Block Handschuhe tragen</p>

Technisches Merkblatt

Wirkungsweise	Der Giftköder Storm Secure vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Bei anhaltender Aufnahme des Köders führt dies zur langsamen inneren Verblutung des Schädlings.
Einstufung	S 2-13-35 Antidot: Vitamin K1
Umweltverhalten	Produkt unerreichbar für Kinder, Nutztiere und Vögel auslegen. Nicht giftig für Bienen. Nicht giftig für Fische bei sachgerechter Anwendung.
Verpackung	1 kg
®	Reg. Warenzeichen der BASF AG
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 27/11/15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch