

Talon[®] Soft

Insektizid

Rodentizid gegen Ratten und Mäuse für den professionellen Einsatz in Aussen- und Innenbereichen.

Produkt	Talon Soft ist eine Paste und enthält 0,005 % (0,05 g/kg) Brodifacoum
Anwendungsbereich	Im Innen- und Aussenbereich von Liegenschaften.
Wirkungsspektrum	<ul style="list-style-type: none"> - Einmalaufnahme reicht aus, um ALLE Ratten- und Mäusearten zu töten. - Bekämpft alle gegen Blutgerinnungshemmer resistenten Nager. - Erfordert weniger Köder und weniger Arbeitszeit als andere Rodentizide. - Schnelle und präzise Applikation. - Ideal für die Applikation in Bereichen der Verarbeitung oder Lagerung von Lebensmitteln.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Handschuhe und andere geeignete Schutzausrüstung tragen - Kuppe am Ende der Röhre abschneiden, ohne das Gewinde zu beschädigen - Kunststoff-Düse bis zu einer Öffnung von ca. 1 cm abschneiden - Düse auf das Rohr vor der Installation der Kartuschenpistole aufschrauben. - Nach der Installation der Kartuschenpistole bis zu 4 g Köder in beide Ecken der Köderbox auftragen. - Nach dem Auftragen überschüssigen Köder am Ende der Box abstreichen. - Bei nicht Gebrauch Düse abdecken und Druck aus der Kartuschenpistole entlassen, um ein Auslaufen zu verhindern. - Köderboxen dort platzieren, wo Mäuse und/oder Ratten aktiv sind, in oder in der Nähe des Zufluchtsortes. - Boxen bei hohem Befall jeweils 5 Meter voneinander entfernt und bei niedrigem Befall 10 Meter entfernt aufstellen. - Boxen mit Köder sollten nicht in der Nähe von heissen Rohren und Öfen etc. platziert werden. - Köder auch vor vorherrschenden Witterungsbedingungen schützen und unzugänglich für Menschen, Haustiere und Wildtiere aufbewahren. - Kontrolle der Köderpunkte in angemessenen Abständen. - Wenn nötig Köder applizieren bis dieser nicht mehr aufgenommen wird.

Technisches Merkblatt

	<ul style="list-style-type: none"> - Bei einem hohen Befall innerhalb der ersten 7 Tage kontrollieren und dann alle zwei Wochen bis der Befall unter Kontrolle ist. Danach bei Bedarf kontrollieren. - Bei niedrigem Befall innerhalb der ersten 7-10 Tage Köder überprüfen. Danach bei Bedarf kontrollieren.
Wirkungsweise	<p>Talon Soft enthält den Wirkstoff Brodifacoum mit einem Bitterstoff gegen unbeabsichtigte Aufnahme. Die Schädlinge werden vom Köder angelockt und nehmen das Produkt durch Frass auf. Brodifacoum ist als Antikoagulant wirksam. Die Blutgerinnung wird unterbunden, die Blutkapillargefässe geschwächt, die Tiere gehen schmerzlos an inneren Blutungen ein. Nach der Aufnahme des Köders kommt es zu einer Entkräftung und schlussendlich zu einem ruhigen Verenden der Tiere.</p>
Beachten	<ul style="list-style-type: none"> - Köder verschlossen und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. - Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort. - Kontakt des Köders mit Kindern, Vögel und Nichtzieltieren (insbesondere Hunde, Katzen, Schweine und Geflügel) verhindern. - Köder müssen sicher ausgebracht werden, um so das Risiko der Einnahme durch Tiere oder Kinder zu verhindern. Wenn möglich Köder sichern, damit sie nicht weggezogen werden können. - Bei Einsatz in öffentlichen Bereichen behandelte Flächen während der Behandlungszeit markieren und ein Hinweis auf das Risiko einer primären und sekundären Vergiftung durch den Wirkstoff geben sowie Angaben der ersten Massnahmen zur Verfügung stellen, die im Falle einer Vergiftung getroffen werden müssen. - Hände und betroffene Hautpartien vor dem Essen und nach dem Gebrauch waschen. - Köder nicht an Stellen legen, bei denen Lebensmittel, Futter oder Wasser verunreinigt werden könnten. - Für die Biozid-Wirkung sind 3-21 Tage notwendig, abhängig von der verbrauchten Menge Köder. - Die Zeit, um einen Befall vollständig zu bekämpfen, wird von Faktoren wie der Grösse des Befalls und das Potenzial für Nagetiere in den umliegenden Gebieten abhängig sein. - Abgestorbene Nagetiere in regelmässigen Abständen während der Behandlung suchen und entfernen, mindestens so oft wie Köder überprüft und/oder aufgefüllt werden.
Mischbarkeit	Talon Soft lässt sich nicht mit anderen Produkten mischen.
Einstufung	Vorsichtsmassnahmen auf der Packung beachten.
Umweltverhalten	---

Technisches Merkblatt

Verpackung	300 g, 12 x 300 g
®	reg. Warenzeichen der Syngenta AG, Basel
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 06.11.15/RH



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch