

Trax TM	Herbizid
---------------------------	-----------------

Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern, Hirsen und Gräsern im Feldbau, Gemüsebau, Beeren und Zierpflanzen.

Produkt	Trax ist ein Suspensionskonzentrat und enthält als Wirkstoff 45.45% Metazachlor (500g/l).
Anwendungsbereich	Trax kann in Erdbeeren, Johanniskraut, Kohlarten, Radies, Rettich, Rucola (Freiland), Raps, Bäume u. Sträucher (ausserhalb Forst). eingesetzt werden.
Wirkungsspektrum	Trax wirkt sehr gut gegen Borstenhirsen, Fingerhirsen, Hühnerhirse, Einjähriges Rispengras, Panicum-Hirsen, Amaranth, Franzosenkraut, Gänsefuss-Arten, Hirtentäschel, Kamille, Mohn, Schwarzer Nachtschatten, Taubnessel, Vogelmiere. Nicht erfasst werden mehrjährige Unkräuter.
Anwendung	<p>Raps: Trax kann im Voraufbau oder im frühen Nachaufbau angewendet werden. Die Unkräuter sollen zum Zeitpunkt der Spritzung möglichst nicht aufgelaufen sein. Die beste Wirkung wird erzielt, wenn der Boden bei der Behandlung feucht ist.</p> <p>Dosierung: Voraufbau 2 l/ha Nachaufbau 1 – 1.5 l/ha als Zweitbehandlung nach einer Voraufbauanwendung.</p> <p>Kohlarten, gepflanzt: 1.5 – 2 l/ha nach dem Pflanzen. Radies, Rettich: 1 l/ha nach der Saat. Johanniskraut: 1.5 l/ha nach der Pflanzung. Erdbeeren (ohne Vermehrungsanlagen): 1.5 – 2 l/ha nach der Pflanzung. Ziergehölze: 2 l/ha. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.</p> <p>Herstellung der Spritzbrühe: Produkt in den halb mit Wasser gefüllten Spritztank geben. Anschliessend mit Wasser auffüllen. Rührwerk ständig laufen lassen.</p>
Wirkungsweise	Der Wirkstoff Metazachlor wird vorwiegend über den Spross der keimenden Unkräuter aufgenommen. Metazachlor wirkt nur auf keimende Unkräuter bis max. 1-Blattstadium, bereits aufgelaufene Pflanzen im fortgeschrittenen Stadium werden nicht oder nur ungenügend erfasst.
Nachbau	Nach einer normalen Kulturdauer können alle Kulturen

Technisches Merkblatt

	nachgebaut werden. Bei vorzeitigem Umbruch ist ein Nachbau von Mais, Kohl, Raps oder Soja möglich.
Einstufung	Xi, N; R 40-43-50/53; S 02-24-35-37-57
Umweltverhalten	Trax ist kein Bienengift. Trax kann in der IP angewendet werden. SPe 2 Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S 2) ausbringen
Verpackung	1 Liter
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch