

# Trax

## **Bodenherbizid für Gemüse-, Feld- und Zierpflanzenbau**



- ✓ **Sehr breites Wirkungsspektrum auf einjährige Unkräuter, Hirsen und Gräser**
- ✓ **Lange Dauerwirkung; ermöglicht der Kultur so den notwendigen Wachstumsvorsprung**
- ✓ **Sichere Bodenwirkung**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45  
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41

[www.leugygax.ch](http://www.leugygax.ch)

 **Leu+Gygax AG**

## Besondere Eigenschaften von Trax

Der Wirkstoff Metazachlor wird vorwiegend über den Spross der keimenden Unkräuter aufgenommen. Metazachlor wirkt nur auf keimende Unkräuter bis max. 1-Blattstadium, bereits aufgelaufene Pflanzen im fortgeschrittenen Stadium werden nicht oder nur ungenügend erfasst.

## Produkteprofil von Trax

Wirkstoff: 45.5 % (500 g/lit Metazachlor)  
 Kennzeichnung: GHS GHS07, GHS08, GHS09  
 Formulierung: Suspensionskonzentrat  
 Packungsgrösse: 1 l und 5 l

Anwendung	Schaderreger	Dosierung	Wartefrist/Anwendung
Johanniskraut	einjährige Ungräser/Unkräuter	1,5 l/ha	nach dem Pflanzen
Kohlarten	einjährige Ungräser/Unkräuter	1,2-2 l/ha	nach dem Pflanzen
Radies Rettich	einjährig Ungräser/Unkräuter	1 l/ha	nach der Saat Vorauslauf
Ruccola	einjährig Ungräser/Unkräuter	0,5 l/ha	ab 3 Blatt Stadium WF 14 Tage
Winterraps	einjährig Ungräser/Unkräuter	2 l/ha	Vorauslauf
	Hirtentäschelkraut	1-1,5 l/ha	Zweitbehandlung nach Vorsaaatherbizid
Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	einjährig Ungräser/Unkräuter	2 l/ha	nach dem Pflanzen

## Wirkungsspektrum

+++	Amarant, Arten
++	Bingelkraut, Einjähriges
+++	Ehrenpreis
+++	Franzosenkraut
+++	Gänsedistel
+++	Gänsefuss, Weisser
+++	Hahnenfuss
++	Hederich
++	Hellerkraut, Acker
+++	Hirtentäschel
++	Hohlzahn, Arten
+++	Hundskamille
+++	Kamille, Echte
++	Klettenlabkraut
++	Knöterich
+++	Kornblume
+++	Kreuzkraut
+++	Melde, Gemeine
+++	Mohn
+++	Nachtschatten, Schwarzer
+++	Portulak
++	Senf
++	Stiefmütterchen, Acker
+++	Taubnessel
++	Vergissmeinnicht, Acker
+++	Vogelmiere
++	Ausfallgetreide
+++	Ackerfuchsschwanz
+++	Borstenhirse, Grüne
++	Erdmandelgras
+++	Fingerhirse, Arten
++	Flughafer
+++	Hühnerhirse
+++	Rispe, Einjährige
++	Trespen
+++	Windhalm, Gemeiner

## Mischbarkeit

Trax ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln mischbar.



**Trax 1-2 l/ha**

## Nachbau

Sollte durch Auswinterung oder andere Umstände ein vorzeitiger Umbruch des mit Trax behandelten Winterrapses erforderlich sein, so können nach bisherigen Erfahrungen im Frühjahr Sommergetreide, Kartoffeln, Sommerraps, Mais, Erbsen, Ackerbohnen, Sonnenblumen, Lein, Futtergräser und Klee-Arten nachgebaut werden. Vor der Neueinsaat im Frühjahr genügt es, den Boden ca. 15 cm intensiv durchzumischen. Nach der normalen Ernte können alle Kulturen nachgebaut werden.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
 Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.